



А. С. БАРСОВ

ШУГАМАН ПРОГРАММЧЛАЛ ГЭЖ ЮУ БОЛОХ ТУХАЙ

Е. С. ВЕНТЦЕЛЬ

ТОГЛООМЫН ОНОЛЫН АНХНЫ МЭДЭГДЭХҮҮН

(ДУНД СУРГУУЛИЙН АХЛАХ АНГИЙН СУРАГ-
ЧИД, ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН МАТЕМАТИ-
КИЙН АНГИЙН ОЮУТАН БОЛОН МАТЕМА-
ТИК СОНИРХОГЧИД, ИНЖЕНЕР, ЭДИЙН
ЗАСАГЧДАД ЗОРИУЛАВ)



БНМАУ
АРДЫН БОЛОВСРОЛЫН ЯАМНЫ ХЭВЛЭЛ
УЛААНБААТАР
1971

— 3478 —

— 2949 —

ТОВЧ АГУУЛГА

А. С. Барсов

1. ШУТАМАН ПРОГРАММЧЛАЛ ГЭЖ ЮУ БОЛОХ ТУХАЙ

Энэхүү товхимол нь сүүлийн жилүүдэд эдийн засаг, техник, цэргийн үйл ажиллагаанд өргөн дэлгэр хэрэглэгддэг болсон математикийн чухал нэгэн салбар болох шутаман программчлалтай уншигчдыг танилцуулна. Энэ товхимол шутаман программчлалын үндсэн бодлогыг тодорхойлж, түүнийг бодох аргаар танилцуулахаас гадна эдийн засгийн тодорхой асуудлыг шийдэхэд энэ аргыг хэрхэн ашиглахтай бас танилцуулна. Мөн түүнчлэн шутаман программчлалын онолыг хамгийн бага цат хэрэглэх, хамгийн бага өртөгтэйгөөр ачаа тээвэрлэх тухай асуудлыг шийдэхэд хэрхэн ашиглаж болохыг үзүүлснээс гадна энэ хоёр асуудлыг хослуулсан бодлогыг яаж бодох арга замыг заажээ.

Энэ товхимлыг, математикийн аргаар төлөвлөх асуудлаар ажиллаж байгаа, математикч, эдийн засагч, инженерүүд мөн энэ асуудалд тооцон бодох автомат машиныг ашиглахыг зорьж буй хүмүүст зориулав.

Е. С. Бенцель

2. ТОГЛООМЫН ОНОЛЫН АНХНЫ МЭДЭГЛЭХҮҮН

Энэхүү товхимлын хоёрдугаар хэсэгт тоглоомын онолын анхны мэдэглэхүүн ба матрицат тоглоомыг бодох зарим аргуудыг хялбарчлан тайлбарласан бөгөөд уул онолын үндсийг барат баталдаггүй, дан ганц жишээгээр дүрсэлэн үзүүлжээ. Энэ номыг судлахад математикийн анализ ба магадлалын онолын анхны мэдэглэхүүний мэдлэг хүрэлцээтэй.

Энэхүү товхимолд эдийн засаг, цэргийн үйл ажиллагаанд өргөн дэлгэр хэрэглэгддэг тоглоомын онолын гол санааг хялбарчлан бичжээ.

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ

ӨМНӨХ ҮГ

Тус товхимолд шутаман программчлалын зарим бодлогыг бодох онол, практикийн асуудлыг авч үзнэ.

Энэхүү товхимлыг үйлдвэрлэлийг төлөвлөх ба зохион байгуулахад математикийн аргыг хэрэглэх асуудлаар ажиллаж буй хүмүүст зориулсан юм.

Энэ товхимолд шутаман программчлалын үндсийг авч үзэхдээ түүний аргыг хялбарчаар тайлбарлахад зайлшгүй шаардлагатай анхны мэдэглэхүүнийг зохих баталганыг хамт оруулсан.

Энэ товхимлыг 1957 онд зохиогчдоос шутаман программчлалын бодлогыг тооцон бодогч электрон машиныг бодох асуудлаар ажиллаж байсан хүмүүст зориулж уншсан лекцэн дээр үндэслэн бичжээ.

ЗХУ-ын ШУ Академийн сурвалжлагч гишүүн Л. А. Лостерник 1959 онд лекцийн материалтай сайтлур танилцаж нилээд үнэтэй зөвлөлтөө өгч уул товчлолыг шийтгэхэд тус дөхөм үзүүлсэн билээ.

Энэ товхимлыг бичих үед тохиолдсон бэрхшээлийг чинихд тул тусалцаа үзүүлсэн проф. А. А. Япуннов, И. С. Красильников нарт талархлаа илэрхийлье.

Миншугаа нягт нямбай ажиллагаагаараа энэ номын чинширм үлэмж сайжруулсан редактор В. Д. Розенконт түүнээ баярлаж байна.

А. С. Барсов

22.16
A-1-224

УДИРГАЛ

Манай оронд үйлдвэрлэх хүчний цашид хөгжүүлэх, социалист үйлдвэрлэлийн төлөвлөлтийг сайжруулах, хөрөнгө оруулалтыг эдийн засгийн үүднээс ашигтайгаар зарцуулах зэрэг асуудлууд жилээс жилд улам бүр ач холбогдолтой болж байна.

Орчин үеийн аж үйлдвэрийг техникжүүлэн хөгжүүлэх олон янзын арга зам, ардын аж ахуйн янз бүрийн салбаруудын хоорондох харилцан холбоо болон эдийн засгийн бусад асуудлууд, дээр дурьдсан зорилтуудыг шийдвэрлэх явдлыг улам ярвигтай болгож байгаа юм.

Эдгээр зорилтыг шийдвэрлэхэд математикийн аргууд, тухайлбал шугаман программчлалын арга, мөн түүнчлэн орчин үеийн техник арга болох тооцон бодогч электрон машин нэн чухал үүрэг гүйцэтгэж байна.

Сүүлийн хориод жилд үүсэн хөгжиж байгаа шугаман программчлалын онол нь одоо үед практикт өргөн дэлгэр хэрэглэгдэх болсон бөгөөд ялангуяа үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт ба төлөвлөлтийн асуудалд ихээхэн ашиглагдах болжээ.

Энэ чиглэлээр гарсан анхны бүтээлүүд нь ЗХУ-ын ШУ Академийн жинхэнэ гишүүн Л. В. Канторовичид хамаарагдах ба тэрээр өөрийн бүтээлүүдээ ачаа тээвэрлэлтийн ашгийг ихэсгэх, үйлдвэрлэлийн хамгийн зохистой ажиглалтааг тодорхойлох, үйлдвэрийн математикийн хэмнэлтэйгээр эсгэх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх математикийн аргыг боловсруулсан юм.

Л. В. Канторовичийн эдгээр бүтээлүүдийн дараа шугаман программчлалын үндсэн аргууд болох симплекс,

хослолын зэрэг арга гарсан бөгөөд эдгээр нь төлөвлөлтийг зохистойгоор гүйцэтгэх янз бүрийн асуудалд ашиглагдах болно. Эдгээр аргуудыг боловсруулах талаар Dantzig, Charnes нар болон зөвлөлтийн хийгээд гадаадын олон эрдэмтэд ажигласан юм.

Шугаман программчлал нь тодорхой нөхцөлд захирагдсан, харилцан хамааралтай олон хувьсагч бүхий бодлогын, зохистой шийдийг олох аргыг боловсруулна. Шугаман программчлалын бодлогыг дараах маягаар тодорхойлж болох юм.

Тэнцэтгэл биш буюу тэнцэтгэлийн систем дүртэй шэрхийлэгдсэн тодорхой нөхцөлийг хангах хэд хэдэн хувьсагчаас шугаман хамааралтай ямар нэг хэмжигдэхүүн (жишээ нь өртөг буюу хугацаа) байна гэж бодь. Тэгээд хувьсагчийн авах утгуудын дотроос функц нь хамгийн бага (их) утгатай байх сөрөг биш утгуудыг олох зорилго тавина.

Жишээ болж дор дурдсан маягаар томъёолж болох ачаа тээвэрлэлтийн бодлогыг авч үзье.

Тус бүр a_i нэгж ачаа бүхий m ширхэг газраас n ширхэг газарт, газар тус бүрд b_j нэгж мөн төрлийн ачаа байхаар зөөвөрлөлт хийх шаардлага гарчээ.

$$(i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$$

Ачаа тээвэрлэлтийг хамгийн бага зардалтай байхыг хэрхэн төлөвлөх вэ?

Хүчтээр i дугаар газраас j дугаар газарт зөөн хүргэх ачааны тоо хэмжээг тэмдэглэе. Ийм тохиолдолд үүд бодлого нь математикийн үүднээс:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i \quad \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j$$

тэнцэтгэлүүдийг хангаж чадах бөгөөд тээврийн нийт цэвэрлэлт

$$C = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

хамгийн бага байх, x_{ij} -ийн сөрөг биш утгуудыг олох шүтлэгдэлд шилжинэ. Үүнд c_{ij} нь i дугаар газраас j дугаар газарт хүргэх нэгж ачааны өртөг болой.

Ийм үед m ширхэг газраас n ширхэг газарт ачаа тээвэрлэхэд хамгийн бага хугацаа хэрэглэхээр ачаа тээвэрлэлтийг төлөвлөх асуудал бас гарч ирдэг.

Шугаман программчлалын арга хэрэглэх өөр нэг жишээ дурдъя.

Заводууд дээр янз бүрийн эдлэл буюу үйлдэхүүнийг үйлдвэрлэхдээ олон тооны автомат дамжуулгаар оруулан гаргадаг. Ийм үед үйлдвэрлэлийг хамгийн зохистойгоор зохион байгуулах олон асуудал гарч ирнэ.

Жишээлбэл n төрлийн эдлэл гаргах m ширхэг суурь машин бүхий тасал байна гэж бодвол i ($i = 1, 2, \dots, m$) дугаар машины ажиллагааг тодорхойлох зүйлүүдэд ажлын сарын тодорхой хугацаа b_i , j дугаар бүтээгдэхүүний нэгж бүрд зарцуулах хугацааны хийгдсэн j дугаар бүтээгдэхүүний нэгж бүрд зарцуулсан өртөг c_{ij} тус тус орно.

Хэрэв энэ тасал ирэх сард бүтээгдэхүүний төрөл бүрээс тодорхой a_j тоо хэмжээний бүтээгдэхүүн гаргах даалгавар өгсөн бол уул даалгаврыг хамгийн ба-
га хөрөнгө зарцуулан биелүүлэхүйцээр үйлдвэрлэлийг зохион байгуулах шаардлага тарна. Хэрэв x_{ij} -гээр i дүгээр машинаар хийсэн j дугаар бүтээгдэхүүний тоо ширхгийг тэмдэглэвэл үг бодлого, бүтээгдэхүүнийг машин бүр дээр $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \geq a_j$, $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n b_i x_{ij} \leq b_i$

нөхцөлд тохируулан хуваарилж,

$$C = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

нийт өртгийг боломжийн хирээр бага болгох асуудалд шилжинэ.

Шугаман программчлалын бодлогод хувьсагчуудын хүлээн авах утгад тавих шаардлага нь шугаман тэнцэтгэл биш буюу тэнцэтгэлийн системээр илэрхийлэгдэх бөгөөд хамгийн бага (их) утгыг нь олбол зохих функц нь бас эдгээр хувьсагчуудын шугаман функц байна. Энэ нь шугаман программчлал гэдэг нэр томъёонд тусгалаа олсон юм.

Зохистой шийдийг олох шугаман программчлалын арга нь уул асуудалд холбогдол бүхий хэд хэдэн шийд авч үзэхийг шаарддаг.

Практик дээр бодлого шинжлэхэд, жишээ нь суурь машин буюу үйлдвэрүүд дээр ажил зохистойгоор ху-

виарилах бодлогыг шинжлэн үзэхэд тодорхой нөхцөлөөс шалтгаалж, нэг шийдээс нөгөө шийдэд шилжинэ гэдэг бол үйлдвэрлэлийн янз бүрийн программг дэс дараалан авч үзнэ гэсэн үг. Чухамхүү ийм шалтгаанаар шугаман программчлал гэдэг нэр томъёо үүссэн.

Нэгэнт шугаман программчлалын бодлого нь функц, тодорхойлогдсон муж дээрээ хамгийн бага (их) утгалаа хүрэх цэгийг олох бодлого юм бол функцлийн экстремумыг олох сонгомол арга жишээ нь Лагранжийн аргыг энэ асуудалд яагаад хэрэглэж бодлоггүй юм бэ? гэдэг асуудал аяндаа гарч ирнэ.

Учрыг шүүн үзвэл сонгомол арга нь, функц экстремумтай байх цэгүүд дээрээ тухайн уламжлалтай байхыг шаарддаг билээ. Гэтэл шугаман функц тодорхойлогдох мужийнхаа захын цэгүүд дээр тухайн уламжлал байхгүй атлаа тэдгээр цэгүүд дээр экстремумтай байдаг учир бий.

Чухам энэ шалтгаанаар экстремум олох янз бүрийн шинэ аргууд бий болсон бөгөөд түүний нэг нь шугаман программчлалын арга болой.

Шугаман программчлалын бодлогыг бодох туршлагаас үзвэл олон тооны хувьсагч бүхий бодлогыг бодоход тооцон бодогч электрон машин зайлшгүй шаардлагатай ба хүн машингүйгээр долоо хоног шахам бодох бодлогыг, машин 2-оос 5 минутанд бодож чадна. Иймд асар олон хувьсагч бүхий бодлогыг зөвхөн тооцон бодох электрон машины тусламжтайгаар гүйцэтгэнэ.

Үүний жишээ болж, Москва хотын барилгын газруудад барилгын элс зөөх зохистой төлөвлөгөө тодорхойлсон бодлогыг дурдаж бодох юм. Энэ бодлогонд 10 газраас 230 газарт элс зөөх асуудлыг авч үзсэн. «Стрела» гэдэг тооцон бодогч электрон машинаар бодож гаргасан зохистой төлөвлөгөө, 1958 оны зурагдугаар сарын нэгэн арав хоногт барагцаалбал 11% ар-
виган хэмнэлт өгсөн юм.

Энэ товхимолд шугаман программчлалын математикийн үндэс ба зарим бодлогыг бодох арга, тухайлбал агаа тээвэрлэлийн бодлогыг авч үзнэ.

1 бүлэг

ШУГАМАН АЛГЕБРЫН ЗАРИМ УХАГДАХУУН БА ТОДОРХОЙЛОЛТ

Энэ бүлэгт шугаман программчлалын бодлогыг бо-
лоход зайлшгүй шаардгдах m хэмжээст огторгуйн
шугаман алгебрын үндсэн ухагдахуун ба тодорхой-
лолтуудыг тайлбарлана.

1 §. m Хэмжээст огторгуйн тухай ухагдахуун

Бодит тооны эрэмбэлэгдсэн гуравт (a_1, a_2, a_3) бүх-
нийт геометрийн үүднээс огторгуйн цэг гэж үзэж бод-
но. Энэхүү геометрийн төсөөдөлтэй уялдуулан мате-
матикт дараах тодорхойлолтыг хэрэглэдэг: *Бодит
гуравтүүдийн олонлогийг гураван хэмжээст ог-
торгуй гэнэ*.

Энэ үед тоонуудын систем (a_1, a_2, a_3) нь гураван
хэмжээст огторгуйд a_1, a_2, a_3 координатууд бүхий M
цэгийг эсвэл a_1, a_2, a_3 байгуулагчид бүхий P векто-
рыг тус тус тодорхойлж байна гэж ярьдаг.

Зарим нэг юмс, үзэгдэл, байдлыг тодорхойлоход
гураван бодит тоо хүрэлцэхгүй явдал байдаг. Жишээ
нь хатуу биеийн байрлалыг огторгуйд тодорхойлоход

1 Үүнтлэн бүх бодит (a_i) тооны олонлог нь нэг хэмжээст огтор-
гуй бөгөөд геометр дүрсэлд нь n утгуун n утгам юм. Мөн бодит тоо-
ны бүх боломжтой (a_1, a_2) хосуудын олонлог нь хоёр хэмжээст
огторгуй болох бөгөөд геометрийн дүрсэлд нь хавтгай болно.

i бодит тоо шаардгаддаг. Хэрэв нэгэн район үйлд-
лэрлэлийн болоод хөлөө аж ахуйн бараа, жишээ нь
илгон, автомашин, тариа, суу, чүдэнз зэрэг бараа үйлд-
лэрлэдэг байвал энэ районы үйлдвэрийн ба хөлөө аж
ахуйн шинж байдлыг тодорхойлоход бодит тооны
эрэмбэлэгдсэн дараалал шаардлагана. Жишээ нь 1 дү-
гээр хүснэгтээс 2 дугаар район жил бүр a_{21} тонн чу-
луу нүүрс, a_{22} тонн төмрийн хүдэр, a_{23} тонн бодл,...
 a_{2n} тонн улаан буудай үйлдвэрлэдэг юм байна гэж мэ-
лэж болно.

Үүний нэгэн адил тухайн оронд ашиглаж байгаа
нисэх онгоцны янз бүрийн шатахуун хэмжээ, тухайн
агуулахад байгаа янз бүрийн нэр төрлийн барааны тоо
хэмжээ цөм тооны эрэмбэлэгдсэн дарааллаар тодор-
хойлогдоно.

1 дүгээр хүснэгт

	Чулуун нүүрс/тн	Төмрийн хүдэр/тн	Бодл (тн)	Зураг, бүрэг/тн
1-р район	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{1n}
2-р район	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{2n}
Коллеар район	a_{n1}	a_{n2}	a_{n3}	a_{nn}

Эдгээр жишээнүүд эрэмбэлэгдсэн m бодит тооны
дарааллуудын олонлогийг авч үзэхийн чухлыг харуулж
байна. Үүнд m нь дурын натурал тоо болой.

Эрэмбэлэгдсэн $(a_1, a_2, \dots, a_1, \dots, a_m)$ m бодит тоо-
ны системийг m хэмжээст вектор гэдэг ба $a_i, i =$
 $= 1, 2, \dots, m$ тоонуудыг $P(a_1, a_2, \dots, a_m)$ векторын
байгуулагчууд гэнэ.

Хэрэв $P(a_1, a_2, \dots, a_m), Q(b_1, b_2, \dots, b_m)$ векторуу-
дийн ижил байранд байгаа байгуулагч тус бүр хоорон-
доо тэнцүү өөрөөр хэлбэл, бүх $i = 1, 2, \dots, m$ -ийн хувьд
 $a_i = b_i$ байвал эдгээрийг тэнцүү векторууд гэнэ.

Хэрэв бид, хоёр районы янз бүрийн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх чадлыг хамтад нь сонирхвол район тус
бүрийн үйлдвэрлэх чадлыг харгалзан нэмэх замаар

гартан авна. Хэрэв 1 дүгээр районы n з бүрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадал $P_1(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1m})$ векторээр 2 дугаар районы $P_2(a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2m})$ вектороор тус тус тодорхойлогдох ахуй хоёр районы хамтран үйлдвэрлэх чадал нь $Q(a_{11} + a_{21}, a_{12} + a_{22}, \dots, a_{1m} + a_{2m})$ векторээр тодорхойлогдоно.

Хэрэв районы үйлдвэрлэх чадал $P = P(a_1, a_2, \dots, a_m)$ векторээр тодорхойлогдож байвал районы үйлдвэрлэх чадал бүтээгдэхүүний нэр төрөл тус бүрийн хувьд дахин нэмэгдсэн бод үйлдвэрлэх чадлыг $Q = Q(ka_1, ka_2, \dots, ka_m)$ векторээр илэрхийлж болно.

Дурдсан тодорхойлогдлууд нь гурван хэмжээст огторгуйн векторууд дээр хийх үйлдлүүдийг цашид дэлгэрүүлсэн нь болой. Гурван хэмжээст огторгуйн тухай ухагдахууныг m бодит тооны дараалал дээр дэлгэрүүлэн хэрэглэсний дүнд дараах чухал тодорхойлогдлод хүрлээ. Бодит байгуулагчууд бүхий m хэмжээст бүх $P(a_1, a_2, \dots, a_m)$ векторуудийн олонлогийг m хэмжээст огторгуй гэх ба P_m гэж тэмдэглэнэ. P ба Q гэсэн m хэмжээст хоёр векторыг нэмэх гэдэг нь нэмэгдэхүүн тус бүрийн харгалзсан байгуулагчуудын нийлбэртэй тэнцүү байгуулагч бүхий гурав дахь $R = P + Q$ векторыг гартан авна гэсэн үг бөгөөд P векторыг k тоогоор үржүүлнэ гэдэг бод байгуулагч тус бүрийг нь энэ тоогоор үржүүлнэ гэсэн үг юм. $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ба $Q(b_1, b_2, \dots, b_n)$ векторуудийн хувьд $b_1 = ka_1, b_2 = ka_2, \dots, b_n = ka_n$ байхаар k тоо олдох байвал P векторыг Q векторт пропорциональ вектор гэх ба $P = kQ$ гэж тэмдэглэнэ.

Хоёр векторын хоорондох пропорциональ чанарыг олон векторуудад дэлгэрүүлэн хэрэглэсний дүнд векторуудийн шугаман эвлүүлгийн тухай ухагдахуун гарч ирдэг.

Хэрэв $P = l_1 P_1 + l_2 P_2 + \dots + l_s P_s$ нөхцөлд тохирох l_1, l_2, \dots, l_s гэсэн бодит тоонууд олдох байвал P векторыг P_1, P_2, \dots, P_s векторуудийн шугаман эвлүүлэгтэнэ. Энэ тохиолдолд P векторын i дугаар байгуулагч нь $(i = 1, 2, \dots, m) P_i, P_2, \dots, P_s$ векторуудийн i дугаар байгуулагчдыг харгалзан l_1, l_2, \dots, l_s тоонуудаар үржүүлж хооронд нь нэмсэнтэй тэнцэнэ.

¹ Үйлдвэрлэх чадал гэдэг нь тодорхой хугацаанд бүтээн гаргасан бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг хэлнэ.

Хэрэв $P_1, P_2, \dots, P_{r-1}, P_r$ векторуудийн ядаж нэг нь бүсдийнхаа шугаман эвлүүлэг болж байвал эдгээр векторуудийг шугаман хамааралтай векторууд гэж нэрлэнэ.

Энэ тодорхойлоглыг өөрөөр тодорхойлж болно. Үүнд:

$$k_1 P_1 + k_2 P_2 + \dots + k_r P_r = 0$$

Тэнцэтгэлийг хангаж чадах ядаж нэг нь тэгээс ялгаатай k_1, k_2, \dots, k_r бодит тоонууд олдож байвал эдгээр векторуудийн системийг шугаман хамааралтай гэх ба үүний эсрэг тохиолдолд шугаман хамааралгүй векторууд гэнэ.

Хэрэв P_0 вектор P_1, P_2, \dots, P_n векторуудийн шугаман эвлүүлэг болж байвал P_0 вектор $\{P_j\}$ ($j = 1, 2, \dots, n$) векторуудийн системээр шугаман маягаар илэрхийлэгдэж байна гэж ярьдаг. Хэрэв нэг вектор, векторуудийн өгөгдсөн системийн дэд системээр шугаман маягтай илэрхийлэгдэж байвал бүх системээр нь мөн шугаман маягтай илэрхийлэгдэнэ. Учир нь үлэх бүх векторуудийг тэгтэй тэнцүү коэффициенттэйгоор авч болно шүү дээ.

Энэ нэр томьёог дэлгэрүүлж, хэрэв Q_1, Q_2, \dots, Q_s систем дэх вектор тус бүр P_1, P_2, \dots, P_n системийн векторуудийн шугаман эвлүүлэг болж чадах байвал Q_1, Q_2, \dots, Q_s векторуудийн систем P_1, P_2, \dots, P_n векторуудийн системээр шугаман маягаар илэрхийлэгдэж байна гэж ярьдаг.

$P^{(m)}$ огторгуйд

$$\left. \begin{aligned} i_1(1, 0, 0, \dots, 0) \\ i_2(0, 1, 0, \dots, 0) \\ \vdots \\ i_m(0, 0, 0, \dots, 1) \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

векторуудийг авч үзье.

Эдгээрийг нэгж вектор гэнэ. Векторуудийн систем (1) нь шугаман хамааралгүй юм. Учир нь $k_1 i_1 + k_2 i_2 + \dots + k_m i_m = 0$ тэнцэтгэл зөвхөн k_i тус бүр ($i = 1, 2, \dots, m$) тэгтэй тэнцүү байхад биелэгдэнэ. $P^{(m)}$ огторгуйн аль ч $P(a_1, a_2, \dots, a_m)$ вектор (1) системийн векторуудээр шугаман маягтай илэрхийлэгдэнэ. Тухайлбал


$$P = a_1 i_1 + a_2 i_2 + \dots + a_m i_m \text{ байна.}$$

Жишээлбэл хавтгай дээр координатын эхнээс нэгэн чиглэлийн дагуу биш, өөрөөр хэлбэл шугаман хамааралгүй P_1, P_2 гэсэн хоёр вектор гарсан гэж санавал гурав дахь аль ч P_0 вектор бүр тэр хоёр векторын шугаман эвлүүлэг болж чадах ажээ.


Мөн үүнчлэн гураван хэмжээст огторгуйд координатын эхнээс гарсан бөгөөд нэгэн хавтгай дээр үл орших гураван вектор өгөгдсөн байвал мөн огторгуйн дурын вектор бүр эдгээр векторуудийн шугаман эвлүүлэг болж чадна. 1 дүгээр зураг дээр P_1, P_2, P_3 гэсэн шугаман хамааралгүй векторуудийн шугаман эвлүүлэг болж байгаа P_0 векторыг дүрслэн үзүүлсэн бөгөөд энэ нь

$$P_0 = P_1 + \frac{1}{2}P_2 + \frac{2}{3}P_3$$


дүрстэй байна.



1 дүгээр зураг.



2 дугаар зураг.



3 дугаар зураг.

Хоёр хэмжээст огторгуйн шугаман хамааралгүй $P_1(a_{11}, a_{21}), P_2(a_{12}, a_{22})$ хоёр вектор тэгтэй тэнцүү биш

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

тодорхойлогч тохирно. Энэ тодорхойлогчийн туйлын хэмжигдэхүүн нь P_1 ба P_2 векторуудээр байгуулагдсан параллелограммын талбайтай тэнцүү (2 дугаар зураг).

Гураван хэмжээст огторгуйд $P_1(a_{11}, a_{21}, a_{31}), P_2(a_{12}, a_{22}, a_{32}), P_3(a_{13}, a_{23}, a_{33})$ гэсэн шугаман хамааралгүй гураван вектор параллелепипед үүсгэх (3 дугаар зураг) ба

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

тодорхойлогчийн туйлын хэмжээ нь тэгтэй тэнцүү биш бөгөөд параллелепипедийн эзлэхүүнтэй тэнцүү. Мөн үүнчлэн, хэрэв m хэмжээст огторгуйд

$$P_j(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}), j = 1, 2, \dots, m$$

шугаман хамааралгүй m вектор өгөгдсөн байвал

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} \end{vmatrix}$$

тодорхойлогч тэгтэй тэнцүү биш байна гэдгийг дээд алгебрт багтаадаг юм.

$$P_j(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}, \dots, a_{mj})$$

$j = 1, 2, \dots, n, l = 1, 2, \dots, m$

гэсэн n ширхэг дурын вектор өгөгджээ гэж үзээд эдгээр векторуудийн байгуулагчаас $m \times n$ эрэмбэтэй матриц зохиё:

$$\begin{vmatrix} P_1 & P_2 & \dots & P_j & \dots & P_n \\ a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & a_{lj} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix} \quad (2)$$

(1) матрицийн багануудыг m хэмжээст векторууд хэмээн үзэж болох бөгөөд тэдгээр нь ерөнхийдөө шугаман хамааралтай ч байж болно. (2) матрицийн шугаман хамааралгүй багануудын хамгийн их тоог матрицийн ранг гэнэ. Өөрөөр өгүүлбэл (2) матрицийн ранг

1. Энд болон цаашид P_j векторын байгуулагчдыг матрицийн баганууд болгон бичиж байв.

2. Матрицийн шугаман хамааралгүй багануудын хамгийн их тоог шугаман хамааралгүй мөрүүдийнхээ хамгийн их тоотой ямагт тэнцүү байдаг.

нь, түүний багануудыг бүрдүүлж буй байгуулагч бүхий шугаман хамааралгүй P_j векторуудийн хамгийн их тоотой тэнцүү. $P^{(m)}$ огторгуйн шугаман хамааралгүйн хамгийн олон векторуудийн системийг энэ огторгуйн суурь гэнэ.

$P_1, P_2, \dots, P_{j-1}, P_j, P_{j+1}, \dots, P_m$ векторуудийг $P^{(m)}$ огторгуйн суурь гэж үзээд A суурь гэж нэрлэе. Тэгвэл энэ огторгуйн дурын P вектор бүхэн $P_j, j = 1, \dots, m$ векторуудээр нэгэн утгатайгаар шугаман маягтай илэрхийлэгдэнэ. Нэгэн вектор огторгуйн ямар ч суурь ижил тооны векторуудээс тогтсон байна.

P_1, P_2, \dots, P_m суурьт үл хамаарагдах Q вектор авахад, хэрэв энэ вектор тэгтэй тэнцүү биш бол

$$Q = \alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2 + \dots + \alpha_{j-1} P_{j-1} + \alpha_j P_j + \dots + \alpha_{j+1} P_{j+1} + \dots + \alpha_m P_m$$

шугаман эвчлүүлгийн ядаж нэг коэффициент нь тэгээс ялгаатай байна.

Жишээ нь $\alpha_j \neq 0$ гэж бодвол A суурийн P_j векторыг $P_j = \frac{1}{\alpha_j} Q - \frac{\alpha_1}{\alpha_j} P_1 - \dots - \frac{\alpha_{j-1}}{\alpha_j} P_{j-1} - \dots - \frac{\alpha_m}{\alpha_j} P_m$ дүрстэй бичиж болно. A сууриас P_j векторыг зайлуулж оронд нь Q векторыг оруулбал $P_1, P_2, \dots, P_{j-1}, Q, P_{j+1}, \dots, P_m$ систем нь дахин суурь болж чадна. Яагаад гэвэл ямар ч векторыг суурь векторуудээр нэгэн утгатай задалж болдог ба хэрэв A сууриас P_j векторыг зайлуулчихвал Q вектор бусад үлэх векторуудийн шугаман эвчлүүлэг болж үл чадна. Иймд $P_1, P_2, \dots, P_{j-1}, Q, P_{j+1}, \dots, P_m$ систем нь шугаман хамааралгүй систем болж суурь үүсгэх болно.

A суурийн аль нэг векторыг уул суурьт үл хамаарагдах векторээр солиход үүссэн B суурийг, A сууриас нэг удаагийн солилцоор гарах суурь гэж нэрлэе.

m хэмжээст огторгуйд $P_0, P_1, P_2, \dots, P_j, \dots, P_n$ гэсэн $n+1$ ширхэг вектор өгөгдсөн бөгөөд эдгээр нь Q_1, Q_2, \dots, Q_m суурь дээр

$$\left. \begin{aligned} P_0 &= \delta_1 Q_1 + \delta_2 Q_2 + \dots + \delta_m Q_m, \\ P_1 &= \alpha_{11} Q_1 + \alpha_{21} Q_2 + \dots + \alpha_{m1} Q_m, \\ P_2 &= \alpha_{12} Q_1 + \alpha_{22} Q_2 + \dots + \alpha_{m2} Q_m, \\ &\vdots \\ P_j &= \alpha_{1j} Q_1 + \alpha_{2j} Q_2 + \dots + \alpha_{mj} Q_m, \\ &\vdots \\ P_n &= \alpha_{1n} Q_1 + \alpha_{2n} Q_2 + \dots + \alpha_{mn} Q_m \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

задралтай юм гэж үзээд энэ задралын байгуулагчдаас

$$\left\| \begin{matrix} P_0 & P_1 & \dots & P_j & \dots & P_n \\ b_1 & a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ b_2 & a_{21} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_i & a_{i1} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_m & a_{m1} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{matrix} \right\| \quad (4)$$

матриц зохиоё. Мөн q_1, q_2, \dots, q_m векторууд $P^{(m)}$ огторгуйн өөр нэг шинэ суурь үүсгэх бөгөөд вектор бүр Q_1, Q_2, \dots, Q_m суурь дээр

$$q_1 = q_{11} Q_1 + q_{21} Q_2 + \dots + q_{m1} Q_m, \\ q_2 = q_{12} Q_1 + q_{22} Q_2 + \dots + q_{m2} Q_m, \\ \vdots$$

$$q_m = q_{1m} Q_1 + q_{2m} Q_2 + \dots + q_{mm} Q_m,$$

задралтай юм гэж бодъё. q_1, q_2, \dots, q_m векторууд суурь үүсгэх учраас

$$\Delta = \begin{vmatrix} q_{11} & q_{12} & \dots & q_{1m} \\ q_{21} & q_{22} & \dots & q_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{m1} & q_{m2} & \dots & q_{mm} \end{vmatrix} \quad (5)$$

тодорхойлогч тэгээс ялгаатай байна.

Хэрэв Q_1, Q_2, \dots, Q_m сууриас q_1, q_2, \dots, q_m суурьт шилжвэл $P_0, P_1, P_2, \dots, P_n$ векторуудийн q_1, q_2, \dots, q_m суурь дээрх задралын коэффициентүүд ерөнхийчлөө Q_1, Q_2, \dots, Q_m суурь дээрх задралын коэффициент тоос ялгаатай байна.

$$P_0 = \delta_1^1 q_1 + \delta_2^1 q_2 + \dots + \delta_m^1 q_m \\ P_j = \alpha_{1j}^1 q_1 + \alpha_{2j}^1 q_2 + \dots + \alpha_{mj}^1 q_m \\ (j = 1, 2, \dots, n)$$

Задралын матриц энэ үед

$$\left\| \begin{matrix} P_0 & P_1 & \dots & P_j & \dots & P_n \\ \delta_1^1 & \alpha_{11}^1 & \dots & \alpha_{1j}^1 & \dots & \alpha_{1n}^1 \\ \delta_2^1 & \alpha_{21}^1 & \dots & \alpha_{2j}^1 & \dots & \alpha_{2n}^1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \delta_m^1 & \alpha_{m1}^1 & \dots & \alpha_{mj}^1 & \dots & \alpha_{mn}^1 \end{matrix} \right\| \quad (6)$$

дүрстэй байна. (6) матрицийн элементүүд нь (4) матрицийн элементүүдээр тодорхойлогдох бөгөөд (5) тодорхойлогч

$$\delta_i^1 = \frac{\Delta^0 i}{\Delta}; \quad a_{ij}^1 = \frac{\Delta^j}{\Delta} \quad (7)$$

томьёогоор тодорхойлогдоно. Үүнд:

$$\Delta_i^0 = \begin{vmatrix} q_{11} & \dots & q_{1,i-1} & b_1 q_{1,i} & \dots & q_{1m} \\ q_{21} & \dots & q_{2,i-1} & q_{2,i} & \dots & q_{2m} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{m1} & \dots & q_{m,i-1} & b_m q_{m,i} & \dots & q_{mm} \end{vmatrix}$$

$$\Delta_i^j = \begin{vmatrix} q_{11} & \dots & q_{1,i-1} & a_{1j} q_{1,i+1} & \dots & q_{1m} \\ q_{21} & \dots & q_{2,i-1} & a_{2j} q_{2,i+1} & \dots & q_{2m} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{m1} & \dots & q_{m,i-1} & a_{mj} q_{m,i+1} & \dots & q_{mm} \end{vmatrix}$$

$$(i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n)$$

Цаашид бид эдгээр тодорхойлогчдыг Δ , Δ_i^0 , Δ_i^j гээр тэмдэглэхийн зэрэгцээ зарим үед

$$\Delta = (q_1, q_2, \dots, q_m); \quad \Delta_i^0 = (q_1, \dots, q_{i-1}, P_0 q_{i+1}, \dots, q_m)$$

$$\Delta_i^j = (q_1, \dots, q_{i-1}, P_j, P_{i+1}, \dots, q_m)$$

тэмдэглэлийг бас ашиглаж байх болно.

Өгөгдсөн векторуудийн системийг шинэ суурь дээр хэрхэн задлах жишээ авч үзье.

P_1, P_2, P_3 суурь дээр $P_0, P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ векторууд

$$\begin{vmatrix} P_0 & P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 & P_6 \\ 5 & 1 & 0 & 0 & -3 & 4 & -1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

матрицаар тодорхойлогдох задралтай юм гэж санах P_4, P_5, P_6 векторуудийн байгуулагчаас үүссэн

$$\Delta = (P_4, P_5, P_6) = \begin{vmatrix} -3 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -18$$

тодорхойлогч тэгээс ялгаатай байгаа учир P_4, P_5, P_6 векторууд суурь үүсгэнэ.

$P_0, P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ векторуудийн P_4, P_5, P_6 суурь дахь задралыг олж (7) томьёог ашиглавал

$$\frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} P_0 & P_5 & P_6 \\ P_4 & P_5 & P_6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} P_1 & P_5 & P_6 \\ P_4 & P_5 & P_6 \end{vmatrix}$$

матриц гарна. Зохих бодолтыг гүйцэтгэсний дараа өгөгдсөн векторуудийн P_4, P_5, P_6 суурь дээрх задралыг харуулсан

$$\begin{vmatrix} P_0 & P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 & P_6 \\ 8 & 1 & 5 & 7 & 1 & 0 & 0 \\ 9 & 11 & 1 & 1 & 18 & 5 & 0 \\ 23 & 9 & 6 & 18 & 18 & 1 & 0 \\ 9 & 9 & 1 & 6 & 11 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

матриц гарна.

P, Q векторуудийн скаляр үржвэр нь

$$(PQ) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_i b_i + \dots + a_m b_m$$

томьёогоор тодорхойлогддог билээ. Үүнд: a_i, b_i нь P, Q векторуудийн байгуулагчид юм. Хэрэв P ба Q векторуудийн скаляр үржвэр тэгтэй тэнцүү байвал, тэдгээрийг тоонолжин векторууд гэнэ. $m \times n$ эрэмбийн матрицийг $(m \times n)$ хэмжээст вектор гэж үзэж болох юм.

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{vmatrix}$$

матрицуудийн скаляр үржвэр гэж

$$\begin{vmatrix} a_{11}b_{11} & a_{12}b_{12} & \dots & a_{1n}b_{1n} \\ a_{21}b_{21} & a_{22}b_{22} & \dots & a_{2n}b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}b_{m1} & a_{m2}b_{m2} & \dots & a_{mn}b_{mn} \end{vmatrix}$$

матрицийн бүх элементүүдийн алгебрын нийлбэрийг үзэх ба $A \cdot B$ гэж тэмдэглэнэ.


2 §. Хэт хавтгай ба хагас огторгуй

$$A_1 x_1 + A_2 x_2 + A_3 x_3 = c \quad (8)$$


нүгдмэл тэгшитгэл нь гурван хэмжээст огторгуйд A_1, A_2, A_3 вектор перпендикуляр хавтгайг тодорхойлдог гэж аналитик геометрээс бид мэдэх билээ. (м) тэгшитгэлийг

$$\frac{x_1}{a_1} + \frac{x_2}{a_2} + \frac{x_3}{a_3} = 1 \quad (9)$$

дүрст шилжүүлье. Энэ тэгшитгэл нь координатын тэнхлэгүүдийг a_1, a_2, a_3 хэрчмүүдээр огтлон өнгөрөх хавтгайг тодорхойлно (4 дүгээр зураг).



4 дүгээр зураг



5 дугаар зураг

Түүнээс гадна гурван хэмжээст огторгуй дахь хавтгайн тэгшитгэлийг $(A^\circ, X) = h$ гэсэн вектор хэлбэртэйгээр бичиж болдог. Үүнд A° нь уул хавтгайд перпендикуляр нэгж вектор, X нь координатын эхийг хавтгайн аль нэг цэгтэй холбосон хувьсах вектор юм. Харин (A°, X) бол A°, X векторуудийн скаляр үржвэр бөгөөд түүний хэмжээ нь X векторын A° вектороз тодорхойлогдох чиглэл дээрх проекц h -тай тэнцүү байна. h нь координатын эхнээс хавтгай хүртэлх зайтай тэнцүү учир $h=0$ байхад хавтгай нь координатын эхийг дайран өнгөрсөн байна.

Хавтгайн цэгийг координатын эхтэй холбосон вектор бүхэн A° векторын чиглэл дээр нэгэн ижил проекцтой байна. (5 дугаар зураг)


Үүнтэй төстэйгээр

$$A_1 x + A_2 x + \dots + A_m x_m = c \quad (8)$$

тэгшитгэлийг хангаж чадах бүх (x_1, x_2, \dots, x_m) цэгүүдийн олонлогийг m хэмжээст огторгуй дахь хэт хавтгай гэж нэрлэе. Энэ хавтгайг $A(A_1, A_2, \dots, A_m)$ вектор нормаль хавтгай гэж үзнэ. Мөн тэрчлэн

$$\frac{x_1}{a_1} + \frac{x_2}{a_2} + \dots + \frac{x_m}{a_m} = 1$$

тэгшитгэл нь координатын тэнхлэгүүдийг a_1, a_2, \dots, a_m хэрчмүүдээр огтлон өнгөрөх хэт хавтгайг дүрсэлнэ. Эцсэд нь $(A^\circ, X) = h$ вектор тэгшитгэл $P(m)$ огторгуйд A° нэгж вектор нормаль бөгөөд координатын хавтгайг тодорхойлох болно.



6 дугаар зураг.

Хавтгай дээрх шулуун нь уул хавтгайгаа хоёр хэсэгт хуваах бөгөөд хэсэгт тус бүрийг хагас хавтгай гэж нэрлэнэ. 6 дугаар зураг дээр, шулуун шулам хавтгайг хоёр хагас хавтгай болгон хуваажээ. Түүнээс гадна нэгэн хагас хавтгай дээр төгсгөл бүхий X_1 векторуудийн проекцууд $h = OC$ -гээс бага, харин нөгөө хагас хавтгай дээр төгсгөл бүхий X_2 векторуудийн проекц h -аас их байна.

Гурван хэмжээст огторгуй дахь хавтгай нь уул огторгуйг хагас огторгуй гэж нэрлэдэх хоёр хэсэгт хуваана.


Үүндлэн m хэмжээст огторгуй дахь хэт хавтгай нь уул огторгуйгаа хоёр хэсэгт хуваана гэж үзээд хэсэгт тус бүрийг нь хагас огторгуй гэж нэрлэе.

$P(m)$ огторгуй дахь хэт хавтгай $(A^\circ, X) = h$ гэсэн вектор тэгшитгэлтэй гэж үзвэл нэгэн хагас огторгуйг тэрх M цэгүүдийг координатын эхтэй холбосон X векторуудийн A° -гийн чиглэл дээрх проекц нь h -аас их, харин нөгөө хагас огторгуй дахь цэгүүдийг координатын эхтэй холбосон векторуудийн проекц h -аас их байна. Тийнхүү хагас огторгуйнуудын нэг нь $(A^\circ, X) < h$ тэнцэтгэл бишид тохирох векторуудийн олонлог болох ба нөгөө хагас огторгуйн векторуудийн хувьд $(A^\circ, X) > h$ байна $A^\circ, X = h$ хэт хавтгайг ил, нэг хагас огторгуйд хамааруулж болно. Тэгвэл m хэмжээст огторгуйн бүх цэгүүд нь $(A^\circ, X) \leq h$ байх нг анги, мөн $(A^\circ, X) > h$ байх өөр нэг анги болон хувишиглана. (Эсвэл $(A^\circ, X) < h$, $(A^\circ, X) \geq h$ байх хоёр анги хуваагдана.)

1 дүгээр жишээ. — $5x_1 + 4x_2 - 3x_3 \leq 5$ гэсэн хагас огторгуй өгөгджээ. Энэ хагас огторгуйд $(0,0,0)$ цэг хамаарах уу?

Үүнд хариулахын тулд $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$ утгуудыг өгөгдсөн тэнцэтгэл бишид тавивал хангалттай. Үүний дүнд $-5 \cdot 0 + 4 \cdot 0 - 3 \cdot 0 \leq 5$ гарах тул $(0,0,0)$ цэг $-5x_1 + 4x_2 - 3x_3 \leq 5$ хагас огторгуйд үнэхээр хамаарах ажээ.

— $5x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 5$ хавтгай $A(-5, 4, -3)$ вектор перпендикуляр байна (7 дугаар зураг).



7 дугаар зураг

2 дугаар жишээ. Бусад хэмжээст огторгуйн $x_1 = 0, x_2 = 4, x_3 = 3, x_4 = -7, x_5 = 0, x_6 = 0, x_7 = 9, x_8 = 1, x_9 = 0$ цэг $4x_1 + 5x_2 - 7x_3 + x_4 - 2x_5 + 12x_6 - 3x_7 \leq 11$ хагас огторгуйд хамаарагдах уу? Энэ цэгийн координатуудыг өгөгдсөн тэнцэтгэл бишид тавивал $4 \cdot 0 + 5 \cdot 4 - 7 \cdot 3 + 0 + 0 - 1 - 2 \cdot 0 - 9 \cdot 12 - 1 \cdot 0 - 3 \cdot 0 = 109 > 11$ гарна. Иймд энэ цэг өгөгдсөн хагас огторгуйд үл харьяалагдана.

3 §. Гүдгэр олон талст


Хэрэв биетийн дурьд хоёр цэгийг холбосон хэрчим нь бүххээрээ, уул биетдээ харьяалагдаж байвал тийм биетийг гүдгэр гэнэ.

Дугуй, бөмбөрцөг, куб, нэгэн цэгээс гарсан хоёр цацрагаар үүссэн өнцөг зэрэг нь гүдгэр биетийн жишээ болж чадна (8 дугаар зураг).

Хэрэв x, y гэсэн хоёр цэгийг A, B гүдгэр биетүүдийн ерөнхий цэгүүд гэж үзвэл (9 дүгээр зураг) x ба y нь A биетэд харьяалагдах учраас тэдгээрийг холбосон хэрчим мөн A биетэд харьяалагдана. Мөн ийм шалтгаанаар энэ хэрчим бас B биетэд харьяалагдана.

Иймд хэрчим нь A ба B биетүүдийн ерөнхий хэсэгт харьяалагдах ажээ. Энэ нь хоёр гүдгэр биетийн ерөнхий хэсэг бас гүдгэр биет байна гэдгийг гэрчилж байна.

Хавтгай дээр өөрийгөө үүсгэхэд оролцож байгаа шулуун тус бүрээс нэг тийш орших олон өнцөгт авч үзье.




8 дугаар зураг.

10 а зураг дээрх олон өнцөгт нь гүдгэр юм. Учир нь ийм олон өнцөгтийн аль ч хоёр x, y цэгүүдийг холбосон хэрчим бүххээрээ уг олон өнцөгттөө харьяалагдаж байна. Харин 10 б дугаар зураг дээрх олон өнцөгт нь түүнийг байгуулахад оролцсон шулуун тус бүрээс нэг тийш оршиж чаддаггүй байна. Ийм олон өнцөгт гүдгэр байх чадахгүй.

Гүдгэр олон өнцөгтөд үл харьяалагдах дурьд M цэг авч үзье (11 а дугаар зураг). Энэ үед уг олон өнцөгт биш M цэг хоёр талд нь байрласан байхаар PQ шулуун талт ямагт татаж болно. Хэрэв шулуун шугам тухайн гүдгэр олон өнцөгттэй ядаж нэг ерөнхий цэгтэй байхын зэрэгцээ, уг олон өнцөгтийн бүх цэгүүд тэрхүү шулуунгаас нэг тийш орших ахуй, түүнийг тулгуур шулуун гэнэ. Ийм тулгуур шулуун хэд ч байж болно.

11 б дүгээр зураг дээрх AD, CB, DB, FN шулуунууд тулгуур шулуунууд бөгөөд ер нь тулгуур шулуун гүдгэр олон өнцөгттэй зөвхөн ганц цэгээр юм уу, бүххэн бүтэн хэрчмээр огтлолцсон байж болно.


Ирмэл хэмжээст огторгуйд талст тус бүрийг агуулсан хиймэл бүхнээсээ нэг тийш орших биет нь гүдгэр биет бөгөөд түүнийг гүдгэр олон талст гэнэ.



9 дүгээр зураг


Олон талст доржаадам чулуу, призм зэрэг нь гүдгэр биетийн жишээ болой.

Хэрэв хавтгай тус бүр олон талсттай наад зах нь нэг ерөнхий цэгтэй байхаас гадна уул олон талст тэдгээр хавтгайнуудаас нэг тийш орших бол ийм хавтгайнуудыг тулгуур хавтгай гэнэ. Тулгуур хавтгай нь олон талсттайгаар түүний орой хэмээн нэрлэгдэх нэг цэг, мөн түүний ирмэг гэж нэрлэгдэх хэрчим, эсвэл түүний талст гэж нэрлэгдэх олон өнцөгтөөс тогтсон ерөнхий хэсэгтэй байж болно.



10 дугаар зураг

Олон талстын орой ба ирмэг бүрийг дайруулан үй олон тулгуур хавтгай татаж болох бөгөөд харин талстыг дайруулан зөвхөн ганц тулгуур хавтгай татаж болно.



11 дүгээр зураг

Хэд хэдэн гүдгэр биетийн ерөнхий хэсэг нь мөн гүдгэр биет байдгийг бид өмнө үзсэн билээ. Ийм хэд хэдэн олон талстын ерөнхий хэсэг гүдгэр биет болох нь илэрхий. Нэгэнт хавтгай нь гүдгэр биет байдаг болохоор олон талст, хавтгай хоёрын огтлолц


олон гүдгэр биет байх ба энэ нь эсвэл цэг, эсвэл шулуун, эсвэл олон өнцөгт байна. Гурван хэмжээст огторгуй дахь гүдгэр биетийн чанартай төстэйгээр олон хэмжээст огторгуй дахь гүдгэр «биетийн» чанарыг авч үзэж болно. Эдгээр чанаруудын заримыг 4.5 §-д авч үзнэ.

4 §. Шугаман тэнцэтгэл бишийн систем

Хоёр хэмжээст огторгуйд

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 \leq b_i^* \quad (i=1, 2, \dots, n) \quad (10)$$

дүрсийн n ширхэг тэнцэтгэл биш өгөгджээ. Ийм тэнцэтгэл биш нэг бүр $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 = b_i$ шулуун заагтай хоёр хагас хавтгайн аль нэгийг тодорхойлох бөгөөд зааглагч $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 = b_i$ шулуун нь $A_i(a_{i1}, a_{i2})$ вектор нормаль байна (10) системийн тэнцэтгэл биш нэг



12 дугаар зураг

нүрийг хангаж чадах (x_1, x_2) хос тоо бүхнийг өгөгдсөн системийн шийд гэнэ. Өөрөөр өгүүлбэл (x_1, x_2) хавтгайн цэгүүдийн дотроос (10) системийг хангаж чадах нэг бүхэн нь шийд болж чадна.

1.

$$\frac{x_1}{3} + \frac{x_2}{2} \leq 1 \text{ буюу } 2x_1 + 3x_2 \leq 6$$

тэнцэтгэл биш хагас хавтгайг тодорхойлно.

“ $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 \geq b_i$ дүрсийн тэнцэтгэл биш бүрийн хоёр талыг “ \geq ” үзүүлсний дараа (10) дүрс шийжинэ.”

(12, а дугаар зураг). Энэ тэнцэтгэл бишид хавтгайн зураасласан хэсэг дэх дурын цэг бүхэн тохирох ба зааглагч шулуун нь $2x_1 + 3x_2 = 6$ тэгшитгэлтээр тодорхойлогдохдоо гадна $A(2,3)$ векторг нормаль байна.

$$2. 2x_1 + 3x_2 \leq 6$$

$$-x_1 + x_2 \leq 2$$


гэсэн хоёр тэнцэтгэл биш нь хавтгайн 12 б дүгээр зураг дээр дүрсэлсэн хэсгийг тодорхойлно.

$$3. 2x_1 + 3x_2 \leq 6$$

$$-x_1 + x_2 \leq 2$$

$$-x_1 - 3x_2 \leq 3$$

тэнцэтгэл бишүүдийг AFB гурвалжны (12 в дүгээр зураг) бүх цэгүүд хангана.



12 (в, г) дүгээр зураг.

$$4. 2x_1 + 3x_2 \leq 6$$

$$-x_1 + x_2 \leq 2$$

$$-x_1 - 3x_2 \leq 3$$

$$x_1 \leq 3/2$$

тэнцэтгэл бишүүдийг $ABCD$ олон өнцөгтийн бүх цэгүүд хангана. (12 г дугаар зураг).

$$5. 2x_1 + 3x_2 \leq 6$$

$$x_1 + x_2 \leq 2$$

$$-x_1 - 3x_2 \leq 3$$


$$2x_1 \leq 3$$

$$-x_1 \leq 3$$

$$-3x_1 + 7x_2 \leq 21$$

$$x_1 - 3x_2 \leq 3$$

гэсэн долоон тэнцэтгэл бишийн шийд нь 4 дүгээр жишээний шийдтэй адил байна.



12 (д, е) дугаар зураг.

(5), (6), (7) тэнцэтгэл бишүүд системийн шийдэлд нөлөөлөхгүй учраас тэдгээрийг анхаарахгүй байж болно. Учир нь (5), (6) тэнцэтгэл бишүүд $ABCD$ олон өнцөгттэй нэг ч ерөнхий цэг байхгүй зааглагч шулуунуудыг тодорхойлно. Харин (7) шулуун нь дүрдсэн олон өнцөгттэй ганц ерөнхий цэгтэй байх ба ийм учраас үүсгүүр шулуун болно. (12, д дүгээр зураг).

$$6. 2x_1 + 3x_2 \leq 6$$

$$x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_1 - 3x_2 \leq 3$$

$$2x_2 \leq 3$$

$$3x_1 - 2x_2 \leq -12$$

Тэнцэтгэл бишийн систем ганц ч шийд байхгүй байна. Үүнийг геометрийн үүднээс үзвэл координат нь үе системийг хангах ганц ч цэг байхгүй гэсэн үг юм (12, е дугаар зураг).


дүгээр жишээнүүдийг авч үзсэний дүнд дараах дүгээлт хийж болно.

1. Хоёр хувьсагч бүхий тэнцэтгэл бишийн систем минимал бийж болно. Энэ тохиолдолд өгөгдсөн сис-


гаар зураг) Мөн түүнчлэн хоёр хувьсагчийн шугам

$$f = c_1x_1 + c_2x_2$$

функц өгөгдсөн гэж үзээд шийдийн олон өнцөгтийн (x_1, x_2) цэгүүдийн дотроос $f = c_1x_1 + c_2x_2$ шугаман функцид хамгийн бага ба их утга өгч чадах цэгүүдийг олж. $f = c_1x_1 + c_2x_2$ функц тодорхой f_1 , f_2 утгатай байх бүх (x_1, x_2) цэгүүдийн олонлогийг авч үзвэл ийм цэгүүдийн олонлог нь $c_1x_1 + c_2x_2 = f_1$ шугаман байна. Энэ шугам нь өмнөх зүйлд тэмдэглэсэн ёсоор координатын эхнээс гарсан $C(c_1, c_2)$ вектор нормаль байна. Одоо C вектор нормаль F шугам (13 дугаар зураг) татаж, түүнийг C векторын эсрэг чиглэлийн дагуу өөртэй нь параллелиар хөдөлгөө. Ийнхүү хөдөлгөх замд F шугам хамгийн түрүүнд олон өнцөгтийн A оройтой дайралдах юм гэж санал. F шугам шугам болно. F шугамныг цааш нь уг чиглэлийн дагуу хөдөлгөөд байвал B оройг дайрах үедээ бас тус тус шугам болж хувирна.



13 дугаар зураг



14 дүгээр зураг


Нэгэнт $C(c_1, c_2)$ векторын эсрэг чиглэл нь $f = c_1x_1 + c_2x_2$ шугаман функцийн хамгийн хурдан өсөх чиглэл, f -ийг, шийдийнхээ олон өнцөгт дээр хүлээн авч утгуудын дотроос хамгийн бага нь F' тулгуур шугам

дээр, хамгийн их нь F'' тулгуур шугам дээр тус тус байна.

Тийнхүү $f = c_1x_1 + c_2x_2$ шугаман функц, хамгийн бага ба их утгадаа $C(c_1, c_2)$ вектор нормаль тулгуур шугамууд ба шийдийн олон өнцөгтийн огтлолцол дээр хүрнэ. Тулгуур шугам, шийдийн олон өнцөгтийн огтлолцол нь эсвэл нэг цэгээс (олон өнцөгтийн орой) эсвэл тоо тоймшгүй олон цэгээс (энэ тогтлолд энэ олонлог нь олон өнцөгтийн тал байна) тогтоно.

14 дүгээр зураг дээр f шугаман функц хамгийнхад үүсгэж утгаг A_1, A_2 хэрчмийн бүх цэгүүд дээр хүрсэн байдлаар хамгийнхад их утгаг олон өнцөгтийн хязгааргүй алслагдсан цэг дээр хүрэх байдлыг дүрсэлжээ.

Үүний нэгэн адил турван хувьсагч бүхий $f = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3$ шугаман функц, $C(c_1, c_2, c_3)$ вектор нормаль, хавтгай дээр тогтмол утга хүлээж авах ба C -гийн чиглэл f функцийн хамгийн хурдан өсөлтийн чиг юм. Ийм функц хамгийн бага ба хамгийн их утгаа, шийдийн




15 дугаар зураг

олон талст $C(c_1, c_2, c_3)$ вектор нормаль тулгуур хавтгайг огтлолцсон цэгүүд дээр хүлээн авна. Үүнд нэг тулгуур хавтгай дээр нь хамгийн бага утгадаа, нөгөө дээр нь, их утгадаа тус тус хүрнэ. (Энэ талст, тулгуур хавтгай хоёрын огтлолцол эсвэл нэг цэгээс (олон талстын орой) эсвэл тоо тоймшгүй олон цэгээс (олон талстын ирмэл, талст) тогтоно.

Ийм цэг нь хязгааргүй алслагдсан цэг байж болно.

Жишээлбэл (6) дугаар зураг дээр f функц ABD талсын бүх цэгүүд дээр хамгийн бага утгаа D цэг дээр



16 дугаар зураг

$= f_1, f = f_2, \dots, f = f_q$ гэж тодруулбал n хэмжээст оролтув $C(c_1, c_2, \dots, c_n)$ гэсэн n хэмжээст вектор нормаль байх

$$\begin{aligned} f &= c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \\ f_2 &= c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \\ f_q &= c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \\ &\text{хэт хавтгайнуудыг тодорхойлно.} \\ f &= c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \end{aligned}$$

Хэлбэрийн хамгийн бага утгыг f_{\min} -ээр хамгийн багд утгыг f_{\max} -аар тус тус тэмдэглэе. Нэгэнт C векторын чиглэлд f хэлбэрийн хамгийн хурдан өсөлтийг чигийг тодорхойлдог учир $f' < f_{\min}$, $f' > f_{\max}$ байх үеийн $f' = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$ хэт хавтгайнууд шийдийн олон талсттай үл огтлолцоно. Нөгөө талаар $f_{\min} \leq f \leq f_{\max}$ үеийн $f' = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$ хэт хавтгайнууд нь шийдийн олон талсттай ерөнхий цэгтэй байх бөгөөд f шугаман хэлбэр хамгийн багд утгадаа хүрэх $M(x_1, x_2, \dots, x_n)$ цэг нь шийдийн олон талст $C(c_1, c_2, \dots, c_n)$ вектор нормаль байх $c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n = f_{\min}$ тулгуур хэт хавтгай хоёрын огтлолцсон цэг байна. Үүнчлэн шийдийн олон талст, мөн C вектор нормаль байх $c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots$

хамгийн их утгадаг тус тус хүрэх байдлыг үзүүлдэг.

Хоёр ба гурва хувьсагч бүхий шугаман функцийн тухай ухагдахууныг цаашир өргөтгөвөл x_1, x_2, \dots, x_n гэсэн n ширхэг бодит хувьсагч бүхий, шугаман хэлбэр гэж нэрлэгддэг $f = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$ дүрсийн функц гарч ирдэг. Үүнд, c_1, c_2, \dots, c_n нь бодит тоонууд бодой. Шугаман хэлбэрийн утгуудыг f бэрийн утгуудыг f

$c_n x_n = f_{\max}$ тулгуур хэт хавтгай хоёрын огтлолцсон цэг дээр f хэлбэр хамгийн их утгатай байна.

Шийдийн олон талст, тулгуур хэт хавтгай хоёрын огтлолцсон нь олон талстын орой, ирмэг буюу «талс» байна.

Тийнхүү шийдийн олон талстын ядаж нэг оройг туулсан цэгүүд дээр шугаман хэлбэр нь зохистой утгатаа хүрнэ. Ийм учраас зохистой шийдийг олохын тулд шугаман хэлбэр хамгийн бага (их) утгаа авах олон талстын оройг сонгон авбал хангалттай юм.

6 §. Шугаман программчлалын бодлогыг бодох үед тэнцэтгэл бишийг тэнцэтгэлд шилжүүлэх

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &\leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &\leq b_2 \\ &\vdots \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n &\leq b_i \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &\leq b_m \end{aligned} \right\} \quad (12)$$

гэсэн n хувьсагч бүхий m шугаман тэнцэтгэл бишийн систем өгөгджээ. Энэ систем нь шийдийн олон талстыг тодорхойлно. Энэ системээс гадна

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n + \mu_1 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n + \mu_2 &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n + \mu_i &= b_i \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n + \mu_m &= b_m \end{aligned} \right\} \quad (12')$$

гэсэн $n+m$ хувьсагч бүхий m алгебрын шугаман тэнцэтгэлийн систем авч үзье. (12) системийн $x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0$ шийд тус бүрд (12') системийн $x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, \mu_1^0, \mu_2^0, \dots, \mu_m^0$ гэсэн тодорхой шийдүүд харгалзах ба тэд тус бүр нэмэлт хувьсагчууд нь $\mu_1^0 \geq 0, \mu_2^0 \geq 0, \dots, \mu_m^0 \geq 0$ нөхцөлийг хангасан байна гэдгийг үзүүлв. Үүнчлэн ч, хэрэв $x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0$ нь (12) системийн шийд мөн бол

$$a_{11}x_1^0 + a_{12}x_2^0 + \dots + a_{1n}x_n^0 \leq b_1$$

$$a_{21}x_1^0 + a_{22}x_2^0 + \dots + a_{2n}x_n^0 \leq b_2$$

$$\dots \dots \dots a_{i1}x_1^0 + a_{i2}x_2^0 + \dots + a_{in}x_n^0 \leq b_i$$

$$\dots \dots \dots a_{m1}x_1^0 + a_{m2}x_2^0 + \dots + a_{mn}x_n^0 \leq b_m$$

тэнцэтгэл бишүүд биедлэгдэнэ.

$$\mu_1^0 = b_1 - (a_{11}x_1^0 + a_{12}x_2^0 + \dots + a_{1n}x_n^0)$$

$$\mu_2^0 = b_2 - (a_{21}x_1^0 + a_{22}x_2^0 + \dots + a_{2n}x_n^0)$$

$$\mu_i^0 = b_i - (a_{i1}x_1^0 + a_{i2}x_2^0 + \dots + a_{in}x_n^0)$$

$$\mu_m^0 = b_m - (a_{m1}x_1^0 + a_{m2}x_2^0 + \dots + a_{mn}x_n^0)$$

гэж тэмдэглэвэл нэгдүгээрт $\mu_1^0 \geq 0, \mu_2^0 \geq 0, \dots, \mu_m^0 \geq 0$

хоёрдугаарт $x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, \mu_1^0, \mu_2^0, \dots, \mu_m^0$ тоонууд (12') ёсоор (12') системийн шийд мөн нь илт байна

Урвуулан (12') системийн $\mu_1^0 \geq 0, \mu_2^0 \geq 0, \dots, \mu_m^0 \geq 0$

нөхцөлийг хангах $x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, \mu_1^0, \mu_2^0, \dots, \mu_m^0$ шийд бүрд (12) системийн тодорхой шийд харгалзана гэдгийг үзүүлбэ. Үнэхээр ч, $x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, \mu_1^0, \mu_2^0, \dots, \mu_m^0$ тоонууд (12') системийн шийд мөн болохоор

$$a_{11}x_1^0 + a_{12}x_2^0 + \dots + a_{1n}x_n^0 + \mu_1^0 = b_1$$

$$\dots \dots \dots a_{m1}x_1^0 + a_{m2}x_2^0 + \dots + a_{mn}x_n^0 + \mu_m^0 = b_m$$

тэнцэтгэлүүдийг бичиж болно. Нэгэнт $\mu_1^0, \mu_2^0, \dots, \mu_m^0$ тоонуудыг сөрөг биш гэж үзсэн учир

$$a_{11}x_1^0 + a_{12}x_2^0 + \dots + a_{1n}x_n^0 \leq b_1$$

$$\dots \dots \dots a_{m1}x_1^0 + a_{m2}x_2^0 + \dots + a_{mn}x_n^0 \leq b_m$$

$$a_{m1}x_1^0 + a_{m2}x_2^0 + \dots + a_{mn}x_n^0 \leq b_m$$

тэнцэтгэл бишүүд биедлэгдэх нь алба бишээ. Өөрөөр хэлбэл $x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0$ тоонууд (12) системийн шийд мөн ажээ.

Тийнхүү (12) системийн бүх $x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0$ шийдүүд, (12') системийн бүх $x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, \mu_1^0, \mu_2^0, \dots, \mu_m^0$ шийдүүдийн хооронд харилцан нэгэн утгатай тохироцгоо тогтоолоо. Тэгэхдээ нэмэлт хувьсагч $\mu_1^0, \mu_2^0, \dots, \mu_m^0$ нь сөрөг биш байх юм. Ийм учраас (12) үүрстэй шугаман тэнцэтгэл бишүүдийн системийг бодох бодлогыг түүнд харгалзах (12) дүрсийн шугаман тэгшитгэлийн системийг бодох асуудалд шилжүүлж болох юм байна.

Шугаман программчлалын бодлогод $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0$ нөхцөлд тохирох хувьсагч бүхий тэнцэтгэл бишийн системийг бодох шаардлага гардаг. Ийм шийдийг сөрөг биш шийд гэж нэрлэдэг. Иймд, нэгэнт тэнцэтгэл бишийн системийг бодох асуудалд нэгбэрын шугаман тэгшитгэлийн системийг бодох асуудалд шилждэг учраас, шугаман программчлалын чухал асуудлуудын нэг нь шугаман тэгшитгэлийн системийн сөрөг биш шийдийг олоход оршино.

Жишээ

$$2x_1 + 3x_2 \leq 6$$

$$-x_1 + x_2 \leq 2$$

$$-x_1 - 3x_2 \leq 3$$

тэнцэтгэл бишүүдийн системийн сөрөг биш шийдийг олгоё. $\mu_1 \geq 0, \mu_2 \geq 0, \mu_3 \geq 0$ нэмэлт хувьсагчдыг оруулж

$$2x_1 + 3x_2 + \mu_1 = 6$$

$$-x_1 + x_2 + \mu_2 = 2$$

$$-x_1 - 3x_2 + \mu_3 = 3$$

гэсэн систем гарган авна. Энэ системийн сөрөг биш шийдүүд өгөгдсөн системийн сөрөг биш тодорхой шийд харгалзах ба мөн үүний урвуу өгүүлбэр бас хүчинтэй гийдэг билээ. Жишээ нь тэгшитгэлийн системийн $x_1 = 1, x_2 = 1, \mu_1 = 1, \mu_2 = 2, \mu_3 = 7$ шийдэд өгөгдсөн системийн $x_1 = 1, x_2 = 1$ гэсэн сөрөг биш шийд харгалзана. Хэрэв тэнцэтгэл бишийн систем нь сөрөг биш шийдийн муж дээр нийцгүй байвал түүнд харгалзах шугаман тэгшитгэлийн систем сөрөг биш шийд байхгүй байна гэдгийг тэмдэглэе.

Шугаман хэлбэрийн, тэнцэтгэл бишийн системээр тодорхойлогдох олон талст дээрх хамгийн бага (их) үнэ шийдийн олон талстын тодорхой нэг орой дээр

байдал бигээ. Шийдийн олон талстын орой бүр харгалзах алгебрын шугаман тэгшитгэлийн системийн сөрөг биш шийдэд тохирох ба тэгэхдээ нэмэлт хувьсагчдыг ядаж нэг нь тэгтэй тэнцүү байна гэдгийг үзүүлж боолно. $\mu_1, \mu_2, 0, \dots, \mu_n \geq 0$ байх нэмэлт хувьсагчийг геометрийн үүднээс тайлбарлаж боолдог.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$\dots$$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i$$

$$\dots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

тэнцэтгэл бишийн системийн шийдийн олон талстыг авч үзье. Энэ системийн $x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0$ сөрөг биш шийдийн нэг нь мэдэгдэж байна гэж үзвэл, түүн шийдийн олон талстад харьяалагдах $M(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ цэг харгалзана.

h_i -гээр M цэгээс i дугаар хэт хавтгай хүртэлх зайг тэмдэглэе. Нэмэлт хувьсагчийн

$$+ a_{12}x_2^0 + \dots + a_{in}x_n^0$$

$$\mu_m^0 = b_m - (a_{m1}x_1^0 + a_{m2}x_2^0 + \dots + a_{mn}x_n^0)$$

утгууд нь μ цэгээс

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$\dots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

хэт хавтгайнууд хүртэлх зайтай пропорциональ байна. Яагаад гэвэл тодорхойлогч ёсоор M цэгээс i дугаар хэт хавтгай хүртэлх зай

$$h_i = \frac{b_i - (a_{i1}x_1^0 + a_{i2}x_2^0 + \dots + a_{in}x_n^0)}{\sqrt{a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + \dots + a_{in}^2}} \quad (i=1, 2, 3, \dots, m)$$

томъёогоор илэрхийлэгдэх ба эндээс

$$\mu_1 = h_1 \sqrt{a_{11}^2 + a_{12}^2 + \dots + a_{1n}^2}$$

$$\dots$$

$$\mu_i = h_i \sqrt{a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + \dots + a_{in}^2}$$

$$\dots$$

$$\mu_m = h_m \sqrt{a_{m1}^2 + a_{m2}^2 + \dots + a_{mn}^2}$$

гэж олддоно.

II БҮЛЭГ

ШУГАМАН ПРОГРАММЧЛАЛЫН ҮНДСЭН БОДЛОГЫГ ШИЙДЭХ

Шугаман программчлал нь дор дурдсан бодлогыг боолдох аргыг судалдаг математикийн нэгэн салбар юм:

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1j}x_j + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2j}x_j + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\dots \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{ij}x_j + \dots + a_{in}x_n &= b_i \\ &\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mj}x_j + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned} \right\} (13)$$

гэсэн n хувьсагч бүхий m шугаман тэгшитгэлийн систем, мөн эдгээр хувьсагчаас хамаарсан

$$f = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_jx_j + \dots + c_nx_n \quad (14)$$

шугаман хэлбэр өгөгдөж, (13) системийн шийдүүдийн дотороос f шугаман хэлбэр хамгийн бага утгатай байх сөрөг биш шийдийг сонгон авах шаардлага гардаг.

Энэ бүлэгт (13) системийн сөрөг биш нэг шийдийг олох арга, мөн шугаман программчлалын үндсэн бодлогыг бодох нэг баримттай танилцана.

7 §. Алгебрын шугаман тэгшитгэлийн системийн адилтгал хувиргалт

(13) систем нь шугаман хамааралгүй r тэгшитгэлийн агуулах бөгөөд тэгшитгэл тус бүр өөр өөр хувь-

¹ f -ийн хамгийн их утгыг олох тухай бодлого бас иймэрхүү машинд томъёолдоно.

сарчийн хувьд бодогдсон байх юм гэж санаа. Эдгээр r тэгшитгэл эхнийхээ r ширхэг хувьсагчийн хувьд бодогдсон байна гэж үзэхэд асуудал явцуурахгүй.

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= b_1 - (a_{1r+1}x_{r+1} + a_{1r+2}x_{r+2} + \dots + a_{1n}x_n) \\ x_2 &= b_2 - (a_{2r+1}x_{r+1} + a_{2r+2}x_{r+2} + \dots + a_{2n}x_n) \\ &\dots \\ x_i &= b_i - (a_{ir+1}x_{r+1} + a_{ir+2}x_{r+2} + \dots + a_{in}x_n) \\ &\dots \\ x_r &= b_r - (a_{rr+1}x_{r+1} + a_{rr+2}x_{r+2} + \dots + a_{rn}x_n) \end{aligned} \right\} \quad (15)$$

(15) системийг хураангуйлан бичвэл

$$x_i = b_i - \left(\sum_{j=r+1}^n a_{ij} x_j \right), \quad i=1, r, \dots, r \quad (15')$$

дүртэй болно. (15) системийн b_i сул гишүүдийг сөрөг биш гэж үзье.

(15) системийн тэгшитгэл тус бүрийг

$$\sum_{i=1}^r x_i P_i = P_0 - \left(\sum_{j=r+1}^n x_j P_j \right) \quad (16)$$

вектор тэгшитгэлийн P_1, P_2, \dots, P_r векторууд дээрх проекц гэж үзэж болно.

Үүнд: $P_1 = P_1(1, 0, \dots, 0)$, $P_2 = P_2(0, 1, 0, \dots, 0)$, \dots , $P_r = P_r(0, 0, \dots, 1)$ векторууд болой. P_1, P_2, \dots, P_r векторууд нь r хэмжээт огторгуйд суурь үүсгэнэ. Энэ үед $P_0, P_1, P_2, \dots, P_r, \dots, P_n$ векторуудийн задралын матриц нь

$$\left\| \begin{array}{ccccccc} P_1 & P_2 & \dots & P_r & P_0 & P_{r+1} & \dots & P_j & \dots & P_n \\ 1 & | & | & | & b_1 & a_{1r+1} & | & a_{1j} & | & a_{1n} \\ | & | & | & | & b_2 & a_{2r+1} & | & a_{2j} & | & a_{2n} \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | & | \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | & | \\ | & | & | & | & 1 & b_i & a_{ir+1} & | & a_{ij} & | & a_{in} \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | & | \\ | & | & | & | & 1 & b_r & a_{rr+1} & | & a_{rj} & | & a_{rn} \end{array} \right\} \quad (17)$$

дүртэй бичигдэнэ.

(16) тэгшитгэлд орсон $P_1, P_2, \dots, P_r, P_{r+1}, \dots, P_n$ векторууд нь бие биеэс ялгаж нэг векторээр ялгагдах r эрэмбийн хэд хэдэн суурь үүсгэх юм гэж санаа. Ийм сууриудыг хувийн суурь гэж нэрлэе. A_1, A_2, \dots, A_n , векторуудийг $P_1, P_2, \dots, P_i, \dots, P_r, P_{r+1}, \dots, P_j, \dots, P_n$ векторуудийн системийн хувийн суурь гэж үзье. Нэгэ

сууриас нөгөө суурьт шилжихэд (15) системийн бүх коэффициент өмнөх бүлгийн (7) томъёогоор хувирах ба энэ үед (15) систем өөртэйгөө ижил шийдтэй эн "цацуу системд шилжинэ."

Хэрэв тэгтэй тэнцүү биш P_0 вектор A суурь дээр

$$P_0 = \sum_{i=1}^r \beta_i P_i, \quad \beta_i \geq 0 \quad \text{дүртэй бичигдэж чадах байвал } A$$

суурийг P_0 векторын хувьд зэрэг суурь гэж нэрлэе.

(15) системийг авч үзвэл түүний ил¹ хувьсагчдад харгалзах P_1, P_2, \dots, P_r векторуудийг агуулсан A суурь бүх $b_r \geq 0$ гэж үзсэн учраас зэрэг суурь мөн болох нь илт байна. (15) системд ил бичигдсэн (x_1, x_2, \dots, x_r) хувьсагчдыг үндсэн хувьсагч, бусдыг нь үндсэн биш хувьсагч гэж нэрлэх ба системийн үндсэн биш хувьсагчдыг тэгтэй тэнцүүлэх үед олдсон шийдийг үндсэн шийд гэнэ.

Вектор бүрийг тухайн суурь дээр зөвхөн ганц утгатай задалж болох теорем ёсоор үндсэн шийд нь дургүйн хувийн суурь дээр бас нэгэн утгатай тодорхойлогдоно.

Цаашид бид алгебрын шугаман тэгшитгэлийн системийг зөвхөн хувийн зэрэг суурь дээр авч үзэх тул онцлогийнхээ товчийг бодож «хувийн», «зэрэг» хэмээх үгүүдийг хэрэглэхээ болгоё.

(15) системийг авч, нэгэн сууриас нөгөө суурьт шилжих дүрмийг тодорхойлб. Үүний тулд (17) матрицийг шингилдэг.

1. Ил гараагүй хувьсагчдын $a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{rj}, \dots, a_{ij}, \dots, a_{nj}$ ($1 \leq i \leq r$) коэффициентүүдийн дотор зэрэг коэффициент заавал байна гэж үзээд тийм коэффициент орсон j -р ($r+1 \leq j \leq n$) баганыг олб². (ийм багана ийгхгүй байх тохиолдлыг 8 §-д үзнэ)

Тийм багана нь j , дүгээр багана бодог.

II. i -гийн бүх утгад a_{ij} зэрэг байх юм гэж бодоод

$$\min \left(\frac{b_i}{a_{ij}} \right) \text{-ийг тодорхойлб.}$$

¹ Хэрэв тэгшитгэлийн нэг хувьсагчийг бусад хувьсагчаар илэрхийлж байвал энэ илэрхийлэгдсэн хувьсагчийг ил хувьсагч гэж нэрлэнэ. (орчуулагч)

² Тэгшитгэлийн (15) систем дүртэй бичих үед хаалтанд орсон коэффициентүүдийн тэмдгийг анхаарна.

Энэ харьцааны минимумуудийн нэг $i = i_1$ байх үед тохиолдох юм гэж санаа. $a_{i_1 i_1}$ элементийг (15) системийн шийдвэрлэгч элемент гэж нэрлэе.

III. i_1 дүгээр тэгшитгэлийн x_{i_1} хувьсагчийг бусдаар нь илэрхийлж, түүнийг утгыг (15) системийн бусад тэгшитгэлүүдэд тавивал өөртөйгөө эн чацуу

$$x_{j_1} = \frac{b_{j_1}}{a_{i_1 j_1}} - \left(\frac{x_{i_1}}{a_{i_1 j_1}} + \sum_{j=j_1+1}^n \frac{a_{i_1 j}}{a_{i_1 j_1}} x_j \right)$$

$$x_i = (b_i - a_{i i_1} \frac{b_{i_1}}{a_{i_1 j_1}} - \left[-\frac{a_{i j_1}}{a_{i_1 j_1}} x_{i_1} + \sum_{j \neq j_1}^n \left(a_{i j} - a_{i i_1} \frac{a_{i_1 j}}{a_{i_1 j_1}} \right) x_j \right])$$

$$i = 1, 2, \dots, i_1 - 1, i_1 + 1, \dots, r - 1,$$

$$x_r = \left(b_r - a_{r i_1} \frac{b_{i_1}}{a_{i_1 j_1}} \right) - \left[-\frac{a_{r j_1}}{a_{i_1 j_1}} x_{i_1} + \sum_{j=j_1+1}^n \left(a_{r j} - a_{r i_1} \frac{a_{i_1 j}}{a_{i_1 j_1}} \right) x_j \right] \quad (j = r + 1, \dots, n)$$

системд шилжинэ. $P_1, P_2, \dots, P_{i_1-1}, P_{i_1}, P_{i_1+1}, \dots, P_r$ векторууд шинэ A_2 суурь үүсгэнэ. Учир нь эдгээр векторуудад харгалзах тодорхойлогч тэгтэй тэнцүү биш

$$\begin{vmatrix} P_1 & P_2 & \dots & P_{i_1-1} & P_{i_1} & P_{i_1+1} & \dots & P_r \\ 1 & 1 & \dots & 1 & a_{i_1 i_1} & a_{i_1 i_1+1} & \dots & a_{i_1 i_r} \\ & & & & 1 & a_{i_1 i_1+1} & \dots & a_{i_1 i_r} \\ & & & & & 1 & \dots & a_{i_1 i_r} \\ & & & & & & \ddots & 1 \\ & & & & & & & a_{i_1 i_r} \end{vmatrix} = a_{i_1 i_1}$$

тул суурь үүсгэнэ гэдгийг (18) систем харуулж байна. Бас шинэ сул гишүүд сөрөг биш учраас дээрх суурь зөрөг байна. Үүнээр ч сул гишүүд

$$b_i - a_{i i_1} \frac{b_{i_1}}{a_{i_1 j_1}} = a_{i i_1} \left(\frac{b_i}{a_{i j_1}} - \frac{b_{i_1}}{a_{i_1 j_1}} \right)$$

үсрэтэйгээс гадна хэрэв $a_{i i_1} > 0$ байвал II дүрэм ёсоор $\frac{b_i}{a_{i i_1}} > \frac{b_{i_1}}{a_{i_1 j_1}}$ байх тул сул гишүүн сөрөг биш, хэрэв $a_{i i_1} \leq 0$ байвал сул гишүүн бас сөрөг биш байх ажээ.

(15) системийг (18) систем болгон хувиргасан I, II, III дүрмээр тодорхойлогдох хувиргалтыг адилтгал хувиргалт буюу симлекс хувиргалт гэнэ.

Адилтгал хувиргалтын тодорхойлолтоос үзвэл (15) маягийн шугаман тэгшитгэлийн систем нь хэрэв тэгшитгэлийн баруун талын хувьсагчдын коэффициент зэрэг байвал адилтгал хувиргалтаар хувиргаж болох ажээ. Алгебрын шугаман тэгшитгэлийн дэс дараалсан адилтгал хувиргалтыг геометрийн үүднээс, энэ системд харгалзсан вектор тэгшитгэлийг нэг удаагийн солиттоор үүсэх инз бүрийн хувийн зөрөг суурь дээр тус дараалан задалсан задаргал гэж тайлбарлаж болно.

Адилтгал хувиргалтыг шугаман программчлалын үндсэн бодлогыг бодоход ашиглахын тулд, түүнийг дор дурдсан нэмэлт нөхцөлтэйгээр авч үзэж байх болно.

(15) системийн хамгийн сүүлчийн r дугаар тэгшитгэлд адилтгал хувиргалтыг дэс дараалан тоо томшиу өгч олон удаа хийж болох юм гэж санаа. Энэ юу гэсэн үг вэ? Гэвэл r дугаар тэгшитгэл дээр адилтгал хувиргалтыг хичнээн ч удаа үйлдлээ гэсэн баруун талын хувьсагчдын коэффициентийн дотор тухай бүрд нивад зөрөг коэффициент байх ба хувиргалт тус бүрд тохирох шийдвэрлэгч элемент нь энэхүү тэгшитгэлд үл харьяалагдана гэсэн үг. Адилтгал хувиргалтын дараалалд сууриас суурьт шилжих $A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow A_3 \rightarrow \dots$ дараалал харгалзана. r, n хоёр төгсгөлтэй байхад бие биеэс ялгаатай суурийн тоо бас төгсгөлтэй байх тул $A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow A_3 \rightarrow \dots$ дарааллын дотор өмнө дайралдсан суурьтайгаа дайралдах үе тохиолдоно. Энэ тохиолдолд «давлалдах» үзэгдэл явагддаг гэж ярьдаг.

Хэрэв адилтгал хувиргалт бүрийн дүнд b_i сул гишүүдийг харгалзах $a_{i i_k}$ коэффициентиг харгалзуулан хамгийн бага харьцаа $\min_i \left\{ \frac{b_i}{a_{i i_k}} \right\}$ тэгээс ялгаатай бай-

¹ Одоо бидний танилцах зүйл нь дурьд i дугаар тэгшитгэлд тохирно гэдгийг сануулах.

вал (18) систем дэх r дугаар тэгшитгэлийн сул гишүүний утга алхам бүрийд хорогдох нь сул гишүүний өөрийнх нь илэрхийллээс илт байна. Үүнд j_k нь шийдвэрлэгч элемент a_{ik} . 2 агуулсан баганын дугаар болно. Сонгон авсан суурь бүр системийн тэгшитгэлийн сул гишүүний утгыг нэгэн утгатай тодорхойлох тульнз бүрийн суурьт сул гишүүний янз бүрийн олонтоо харгалзах ба үүний урвуу өгүүлбэр бас хуучин төгөлдөр байна. Ийм учраас энэ тохиолдолд өмнө тохиолдсон суурьтай дахин дайралдах боломжгүй байна. Иймд тоо томшгүй олон хувиргалтын дараалал байж болохгүй нь мэдээж биз. Энэ нь төлөгөлтэй тооны хувиргалтын дараа эсвэл r дугаар тэгшитгэлийн баруун талын үл мэдэгдэхийн бүх коэффициентүүд эерэг биш $a_{rj} \leq 0$ болох ($r+1 \leq j \leq n$) эсвэл ямар нэг хувиргалтын шийдвэрлэгч элемент энэ тэгшитгэлд хамаарах юм гэдгийг нотолж байна.

Хэрэв аль нэг хувиргалтаас эхлээд хувиргалтын шийдвэрлэгч элемент, тэгтэй тэнцүү b_i сул гишүүн бүхий тэгшитгэлүүдэд харьяалагдаж байвал r дугаар тэгшитгэлийн сул гишүүний утга өөрчлөгдөхгүй үлдэнэ. Яагаад гэвэл (18) системийн сүүлчийн тэгшитгэлээс сул гишүүний $b_r - a_{rj} \frac{b_i}{a_{ij}}$ илэрхийлэл дэх хавсгалч нь тэгтэй тэнцүү байх нь харагдаж байна. Ийм нөхцөлд давтагдах үзэгдэл гарах боломжтой байдаг.

Наад зах нь хоёр суурь векторыг дайран өнгөрөх хэт хавтгайг суурь хэт хавтгай гэж нэрлэе. Хувиргалтад эрж буй системийн тэгшитгэлүүд тээс ялгаатай сул гишүүнтэй байна гэдэг бол P_0 вектор нэг буюу хэд хэдэн хэт хавтгайд зэрэг харьяалагдана гэсэн үг юм. Энэ тохиолдлыг ном зохиолд хэргэлдэг нэр томъёоны дагуу бөхөх үзэгдэл явагдаж байна гэж ярьдаг.

Тийнхүү «давтагдах» үзэгдэл явагдах зайлшгүй нөхцөл нь бөхөх үзэгдэл явагдахад оршино. Жишээ болгож

$$\begin{aligned} x_1 &= 2 - (2x_4 + x_5) \\ x_2 &= 3 - (3x_4 - x_5) \\ x_3 &= 2 - (x_4 + 2x_5) \end{aligned}$$

систем авч үзье.

Үүнд тохирох вектор тэгшитгэл нь

$$x_1 P_1 + x_2 P_2 + x_3 P_3 = P_0 - (x_4 P_4 + x_5 P_5)$$

дүртэй байх ба векторуудийн байгуулагчид нь


$$\begin{vmatrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

матрицийг үүсгэнэ.

P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 векторууд хэд хэдэн суурь үүсгэнэ (17 а дугаар зураг). Жишээ нь P_1, P_2, P_3 нэг суурь P_1, P_3, P_4 өөр нэг суурь үүсгэнэ. P_1, P_2, P_3 суурьт $x_1=2, x_2=3, x_3=3, x_4=2, x_5=0$, үндсэн шийд харгалзана. Энэ үед P_0 вектор

$$P_0 = 2P_1 + 3P_2 + 2P_3$$

нэг эерэг коэффициент бүхий шугаман явлуулал болон бичигдэнэ. Үүнийг геометрийн үүднээс тайлбарилбал P_0 вектор P_1, P_2, P_3 векторууд дээр байгуулагдсан параллелепипедийг «нэвтлэн» өнгөрнө гэсэн үг юм (17 б дугаар зураг). Одоо өгөгдсөн тэгшитгэлийг P_1, P_3, P_4 суурь дээр бичье. Үүний тулд адилтгал хувируулалт хийе. x_4 хувьсагчийн коэффициентүүдийн до-



17 дугаар зураг.

нэг эерэг коэффициент байгаа учир $\min \left(\frac{2}{2}, \frac{3}{3} \right)$;

1) нилг олбё. Шийдвэрлэгч элемент болгож нэгдүгээр тэгшитгэл дэх x_4 хувьсагчийн коэффициентийг авч үзье. Энэ тэгшитгэлээс x_4 -ийг олж нөгөө хоёр тэгшитгэлд тавивал

$$\begin{aligned}x_4 &= 1 - \left(-\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_5\right) \\x_2 &= 0 - \left(-\frac{3}{2}x_1 - \frac{5}{2}x_5\right) \\x_3 &= 1 - \left(-\frac{1}{2}x_1 + \frac{3}{2}x_5\right)\end{aligned}$$

систем үүснэ. Эдгээр тэгшитгэлийг ажвал P_0 вектор P_2, P_3, P_4 суурь дээр $P_0 = 0 \cdot P_2 + P_3 + P_4$ гэж бичигдэх ажээ. Энэ тохиолдолд P_0 вектор P_2, P_3, P_4 векторууд дээр тодорхойлогдох суурь хавтгай дээр орших учраас бөхөх үзэгдэл явагдаж байна. Иймд P_0 вектор P_2, P_3, P_4 векторууд дээр байгуулсан параллелепипедийн талс дээр оршино (17 в дүгээр зураг). Хэрэв бид адилтгал хувиргалтын дүрмийг зөрчсөн ахул P_0 векторыг суурь векторуудийн сөрөг биш коэффициенттэй шугаман эвдүүлэг болгон бичиж үл болох тийш суурьт шилжих байсан гэдгийг анхааруулъя. Жишээ нь хэрэв шийдвэрлэгч элемент болж $\min \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{1}\right)$ -д тохирох элементийг биш харин гуравдугаар тэгшитгэл дэх x_4 -ийн коэффициентийг авч зохиодурумээр уул системээ хувиргавал

$$\begin{aligned}x_4 &= 2 - (x_3 + 2x_5) \\x_1 &= -2 - (-2x_3 - 3x_5) \\x_2 &= -3 - (-3x_3 - 7x_5)\end{aligned}$$

P_0 вектор P_1, P_2, P_3 суурь дээр сөрөг коэффициенттэй агуулсан $P_0 = -\frac{1}{2}P_1 - \frac{1}{3}P_2 + \frac{2}{3}P_3$ сөрөг шугаман эвдүүлэг болон задрах ба уул систем

$$x_1 = -2, x_2 = -3, x_3 = 0, x_4 = 2, x_5 = 0$$

гэсэн эерэг биш шийдтэй байна гэдгийг сүүлчийн системээс гаргаж авч болно. Энэ тохиолдолд P_0 вектор P_1, P_2, P_3 векторууд дээр байгуулсан параллелепипедийг нэвтлэн өнгөрөхгүй (17 г дугаар зураг).

Тийнхүү адилтгал хувиргалтын дүрмийг зөрчих сөрөг суурьд хүргэж болох ажээ.

Адилтгал хувиргалтаар «давтагдах» үзэгдэлд хүргэж болох тэгшитгэлийн систем авч үзье:

42

$$\begin{aligned}x_1 &= 0 - (x_4 - x_5 - x_6 + 3x_7) \\x_2 &= 0 - (2x_4 - x_5 - \frac{1}{2}x_6 + x_7) \\x_3 &= 1 - (x_4 + x_5 + 3x_6 - 8x_7) \\&= \end{aligned}$$

Системийн хувиргалтыг гуравдугаар тэгшитгэлийнх нь хувьд авч үзье. Энэ тэгшитгэлийн x_4 -ийн коэффициент эерэг бөгөөд нэгтэй тэнцүү байна. $\left(\frac{0}{1}, \frac{0}{1}, \frac{1}{1}\right)$ харьцаануудын минимумын нэг нь нэгдүгээр харьцаа байна. Иймд шийдвэрлэгч элемент болж нэгдүгээр тэгшитгэлийн x_4 -ийн коэффициентийг авч болно. Нэгдүгээр тэгшитгэлээс x_4 -ийг олж, түүний илэрхийллийг үлэх хоёр тэгшитгэлд тавивал

$$\begin{aligned}x_4 &= 0 - (x_1 - x_5 + x_6 + 3x_7) \\x_2 &= 0 - (-2x_1 + x_5 + \frac{3}{2}x_6 - 5x_7) \\x_3 &= 1 - (-x_1 + 2x_5 + 4x_6 - 11x_7)\end{aligned}$$

Энэ хувирсан систем үүснэ. Энэ системийн сүүлчийн тэгшитгэлийн баруун талд бас л эерэг коэффициентүүд байна. Жишээ нь x_5 -ын коэффициентийг зааж болох юм. Энэ тохиолдолд $\min \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{2}\right)$ хоёрдугаар тэгшитгэлд тохирох учраас тэрхүү тэгшитгэлийн x_5 -ын коэффициентийг шийдвэрлэгч элемент болгон авч болно. Энэхүү шинэ шийдвэрлэгч элементэд тохирсон адилтгал хувиргалт хийсний дүнд

$$\begin{aligned}x_5 &= 0 - (-2x_1 + x_2 + \frac{3}{2}x_6 - 5x_7) \\x_4 &= 0 - (-x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_6 - 2x_7) \\x_3 &= 1 - (-3x_1 - 2x_2 + x_6 - x_7)\end{aligned}$$

Систем үүснэ. Энэ системийн гуравдугаар тэгшитгэлийн баруун талд x_6 -гийн коэффициент эерэг байгаа бөгөөд хоёрдугаар тэгшитгэлийн x_6 -гийн коэффициентийг шийдвэрлэгч элемент болгон авч адилтгал хувиргалтыг гүйцэтгэвэл

$$\begin{aligned}x_6 &= 0 - (2x_1 + 2x_2 + 2x_4 - 4x_7) \\x_5 &= 0 - (x_1 - 2x_2 - 3x_4 + x_7) \\x_3 &= 1 - (5x_1 - 4x_2 - 2x_4 + 3x_7) \\&= \end{aligned}$$

43

систем гарна. Тухай бүр гуравдугаар тэгшитгэл дэх аль нэг зөрөл коэффициентийг сонгон авч доогуур нь зуран, түүнд тохирох шийдвэрлэгч элементийг тод үсгээр тэмдэглэж адилтгал хувиргалтыг дэс дараалал үйлдвэл анхны системийн, янз бүрийн хувийн зөрөл суурь дээрх илэрхийлэл гарна.

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= 0 - (x_1 - 2x_2 - 3x_4 + x_6) \\ x_6 &= 0 - (2x_1 - 6x_2 - 10x_4 + 4x_5) \\ x_3 &= 1 - (2x_1 + 2x_2 + 7x_4 - 3x_6) \end{aligned} \right\}$$

$$x_1 = 0 - (-3x_2 - 5x_4 + 2x_5 + \frac{1}{2}x_6)$$

$$x_1 = 0 - (x_2 + 2x_4 - x_5 - \frac{1}{2}x_6)$$

$$x_3 = 1 - (8x_2 + 17x_4 - 7x_5 - x_6)$$

$$x_1 = 0 - (x_4 - x_6 + 3x_1)$$

$$x_2 = 0 - (2x_4 - x_5 - \frac{1}{2}x_6 + x_1)$$

$$x_3 = 1 - (x_4 + x_5 + 3x_6 - 8x_1)$$

Ийнхүү адилтгал хувиргалтыг зургаа дахин үйлдсэн дүнд анхны системд буцаж ирлээ.

Тийнхүү адилтгал хувиргалтын

$$P_1 P_2 P_3 \rightarrow P_4 P_2 P_3 \rightarrow P_6 P_6 P_3 \rightarrow P_1 P_6 P_3 \rightarrow P_1 P_1 P_3 \rightarrow P_1 P_6 P_3$$

сууриуд дахь дараалал давтагдах үзэгдэлд хүргэсн ажээ.

Ер нь бөхөх үзэгдэл давтагдах үзэгдэлд хүртэл нь тэр бүр алба биш гэдгийг дараах жишээгээр үзүүлбэ:

$$x_1 = 0 - (x_4 - 2x_5 + 4x_6 + x_1 - 3x_8 + x_9)$$

$$x_2 = 0 - (2x_4 - x_5 + x_6 - 2x_1 - 2x_8 + 4x_9)$$

$$x_3 = 0 - (-x_4 + 2x_5 - 3x_6 + 3x_1 - 4x_8 + x_9)$$

$$0 = 1 - (3x_4 - x_5 - 2x_6 + x_1 - x_8 + x_9)$$

Суулийн тэгшитгэлийн x_4 -ийн коэффициент зөр байгаа учир нэгдүгээр тэгшитгэл дэх x_4 -ийн коэффициентийг шийдвэрлэгч элемент болгон авч болно.

Адилтгал хувиргалт үйлдсэн дараа

$$x_4 = 0 - (x_1 - 2x_5 + 4x_6 + x_1 - 3x_8 + x_9)$$

$$x_2 = 0 - (-2x_1 + 3x_5 - 7x_6 - 4x_1 + 4x_8 + 2x_9)$$

$$x_3 = 0 - (x_1 + x_6 + 4x_1 - 7x_8 + 2x_9)$$

$$0 = 1 - (-3x_1 + 5x_5 - 14x_6 - 2x_1 + 8x_8 - 2x_9)$$

систем үүснэ. Ийм хувиргалтыг цаашид үргэлжлүүлнэ эхлээд

$$x_5 = 0 - (-\frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 - \frac{7}{3}x_6 - \frac{4}{7}x_1 + \frac{4}{3}x_8 + \frac{2}{3}x_9)$$

$$x_4 = 0 - (\frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 - \frac{2}{3}x_6 - \frac{5}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_8 + \frac{7}{3}x_9)$$

$$x_3 = 0 - (x_1 + x_6 + 4x_1 - 7x_8 + 2x_9)$$

$$0 = 1 - (\frac{1}{3}x_1 - \frac{5}{3}x_2 - \frac{7}{3}x_6 + \frac{14}{3}x_1 + \frac{4}{3}x_8 - \frac{16}{3}x_9)$$

систем, дараа нь

$$x_1 = 0 - (\frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_6 - \frac{7}{4}x_8 + \frac{2}{4}x_9)$$

$$x_5 = 0 - (-\frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_8 - \frac{6}{3}x_2 - \frac{3}{3}x_8 - \frac{4}{3}x_9)$$

$$x_4 = 0 - (\frac{1}{12}x_1 + \frac{2}{3}x_2 + \frac{5}{12}x_3 - \frac{3}{12}x_6 - \frac{39}{12}x_8 + \frac{38}{12}x_9)$$

$$0 = 1 - (-\frac{10}{12}x_1 - \frac{5}{3}x_2 - \frac{14}{12}x_3 - \frac{47}{12}x_6 + \frac{114}{12}x_8 - \frac{92}{11}x_9)$$

систем тус тус үүснэ. Суулийн системийн эцсийн тэгшитгэл дэх x_6 -гийн коэффициент зөрөгөөс гадна шийдвэрлэгч элемент болж чадах тул тоо томшгүй

олон адилтгал хувиргалт байж болох боломжгүй болой. Тийнхүү бөхөх үзэгдэл давтагдах үзэгдэлд хуви- гэж чадсангүй. $a_{43} = \frac{114}{12}$ шийдвэрлэгч элементэд тохирох адилтгал хувиргалтыг үйлдэж, үндсэн биш хувьсагчдын холбоогдлыг тэгтэй тэнцүүлбэл анхны системийн нэг үндсэн шийд олноо:

$$x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_6 = 0, x_9 = 0$$

$$x_4 = \frac{13}{18}; x_5 = \frac{4}{38}; x_7 = \frac{7}{38}, x_8 = \frac{4}{38}$$

Давтагдах үзэгдэл, шутаман тэгшитгэлийн системийн коэффициентүүд олон тооны нөхцөл хангахыг шаардлаг ба коэффициентуудыг нарийн чанд сонгох авсны дүнд давтагдах үзэгдэл гарч болдог учир давтагдах үзэгдлийг харуулж чадах жишээ зохиох нь мөтөвөгтэй гэдгийг тэмдэглэх нь зүй.

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= 0 - (a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + \sum_{j=5}^n a_{1j}x_j) \\ x_2 &= b - (a_{23}x_3 + a_{24}x_4 + \sum_{j=5}^n a_{2j}x_j) \end{aligned} \right\} (19)$$

гэсэн хоёрхон тэгшитгэлийн систем байх үед давтагдах үзэгдэл байж үл болно гэдгийг харуулъя. Эхлээд системд тохирох векторуудын матриц нь

$$\begin{pmatrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 \\ 1 & 0 & 0 & a_{13} & a_{14} \\ 0 & 1 & b & a_{23} & a_{24} \end{pmatrix}$$

дүрстэй байх ба $b > 0$ байвал P_1, P_2 векторууд суурь үүсгэнэ. P_3 векторын байгууллагчдын утгыг энэ суурь дээр

$$a_{13} = \begin{vmatrix} a_{13} & 0 \\ a_{23} & 1 \end{vmatrix}; \quad a_{23} = \begin{vmatrix} 1 & a_{13} \\ 0 & a_{23} \end{vmatrix}$$

тодорхойлогчоор илэрхийлж болно. Хэрэв a_{23}, a_{13} тэгээс их гэж үзвэл, a_{13} элементийг шийдвэрлэгч элементэд тооцон P_1, P_2 сууриас P_3, P_4 суурьт шилжээд адилтгал хувиргалтыг (19) систем дээр хийж болно. Шинэ P_3, P_2 суурь дээр (19) системийн коэффициентүүд өмнөх бүлгийн (7) томъёогоор тодорхойлогддог утгатай байна. Жишээ нь x_4 хувьсагчийн коэффициентийн утга

$$\text{Нэрдүгээр тэгшитгэлийн хувьд } \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} a_{14} & 0 \\ a_{24} & 1 \end{vmatrix}$$


$$\text{Хоёрдугаар тэгшитгэлийн хувьд } \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} a_{13} & a_{14} \\ a_{23} & a_{24} \end{vmatrix}$$

дүрстэй байна. Үүнд: $\Delta = \begin{vmatrix} a_{13} & 0 \\ a_{23} & 1 \end{vmatrix}$ Хэрэв эдгээр илэрхийллийн хүрлвэрүүд нь эерэг байх ахул x_4 -ийн коэффициент P_3, P_2 суурь дээр эерэг байх бөгөөд (19) системд тохирох хамгийн бага харьцаа нь дахин нэгдүгээр тэгшитгэлд оногдох тул нэгдүгээр тэгшитгэлийн x_4 -ийн коэффициентийг шийдвэрлэгч элементэд тооцон, P_3, P_2 сууриас P_4, P_2 суурьт шилжих замаар уул системийг адилтгалаар хувиргаж болно.

$P_1, P_2 \rightarrow P_3, P_2 \rightarrow P_4, P_2 \rightarrow \dots \rightarrow P_k, P_2 \rightarrow P_1, P_2$ дараалал давтагдах үзэгдэл үүсгэж болохоор адилтгал хувиргалт үйлдэж болох юм гэж санавал дараах дараалал дахь тодорхойлогч бүр заавал эерэг байх ёстой. (Доод өгнээний тодорхойлогчид хоёрдугаар тэгшитгэлийн эерэг коэффициентүүдийн дараалалд харилгах ба дээд өгнээний тодорхойлогчид шийдвэрлэгч элементүүдэд харгалзана).

$$(P_1, P_2) (P_3, P_2) (P_4, P_2) \dots (P_{k-1}, P_2) (P_k, P_2) (P_1, P_2) (P_1, P_3) (P_3, P_4) \dots (P_{k-2}, P_{k-1}) (P_{k-1}, P_k) (P_k, P_1) (20)$$

Индүций авч үзэж буй тохиолдолд P_j нь хоёр хэмжээст вектор үүл (20) дараалал дахь тодорхойлогч бүрийн үетн хэмжээ ба тэмдэгээрээ тохирох вектор үржвэртэйгээ адилтана. Тэгвэл (20) дахь бүх тодорхойлогч эерэг байх шийдвэрлэгч нь P_3 вектор хоорондоо хурц өнцөг үүсгэсэн P_1, P_2 векторуудын хооронд, P_4 вектор P_3 ,



18 дугаар зураг

$$\begin{array}{c}
 1 \dots i_1 \dots i_2 \dots r \\
 \left| \begin{array}{cccc} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{array} \right| \begin{array}{c} a_{1i_1} \\ a_{1i_2} \\ a_{1i_3} \\ a_{1i_4} \end{array} \\
 \vdots \\
 1 \dots i_1 \dots i_2 \dots r \\
 \left| \begin{array}{cccc} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{array} \right| \begin{array}{c} a_{1i_1} \\ a_{1i_2} \\ a_{1i_3} \\ a_{1i_4} \end{array} \\
 \vdots \\
 1 \dots i_1 \dots i_2 \dots r \\
 \left| \begin{array}{cccc} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{array} \right| \begin{array}{c} a_{1i_1} \\ a_{1i_2} \\ a_{1i_3} \\ a_{1i_4} \end{array} \\
 \vdots \\
 1 \dots i_1 \dots i_2 \dots r \\
 \left| \begin{array}{cccc} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{array} \right| \begin{array}{c} a_{1i_1} \\ a_{1i_2} \\ a_{1i_3} \\ a_{1i_4} \end{array}
 \end{array}$$

г эрэмбийн бүх тодорхойлогчдыг зэрэг гэж үзвэрчигд орохыг шалгаж үзье.

Эдгээр долоон тодорхойлогчийг задалбал:

- 1) $a_{111} > 0$;
- 2) $a_{r11} > 0$;
- 3) $a_{111}a_{122} - a_{121}a_{112} > 0$ 6) $a_{122}a_{r11} - a_{r12}a_{121} < 0$;
- 4) $a_{111}a_{r12} - a_{r11}a_{112} > 0$;
- 5) $a_{112} > 0$;
- 7) $a_{r12} < 0$.

1), 2), 4), 7), тэнцэтгэл бишүүдээс $a_{112} < 0$, 2), 5) 6), 7) тэнцэтгэл бишүүдээс $a_{121} < 0$ болохыг мэдэж болно.

$$\begin{aligned}
 a_{111} &= \epsilon, & a_{r12} &= -\eta, \\
 a_{r11} &= k\epsilon, & a_{112} &= -k_1\eta, \\
 a_{122} &= q\epsilon, & a_{121} &= -q_1\eta.
 \end{aligned}$$

гэж тус тус тэмдэглэе. Үүнд: $\epsilon, k, q, \eta, k, q$ нь зэрэг тоонууд болой.

- Тэгвэл 3) аас $\epsilon q\epsilon - k_1q_1\eta^2 > 0$ | $q\epsilon^2 - k_1q_1\eta^2 > 0$;
- 4) өөс $-\epsilon\eta + k_1k\epsilon\eta > 0$ | $kk_1 - 1 > 0$;
- 6) гаас $q_1\eta^2 - kq\epsilon^2 > 0$ | $q_1\eta^2 - kq\epsilon^2 > 0$.

тэнцэтгэл бишүүд гарах ба цаашид

$$\begin{aligned}
 q\epsilon^2 &> k_1q_1\eta^2, \\
 \frac{q_1\eta^2}{q_1\eta^2} &> kq\epsilon^2, \\
 qq_1\epsilon^2\eta^2 &> k_1kq_1q_2\epsilon^2\eta^2, 1 > k_1k.
 \end{aligned}$$

болох нь илт байна. $k_1, k < 1$ тэнцэтгэл бишийг үүний өмнөхөн гарсан $k_1k_2 > 1$ тэнцэтгэл биштэй зэрэгцүүлж үзвэл зөрчил гарах нь илт бизээ.

Ийнхүү зургаанаас доошгүй тооны адилтгал хувиргалт хийсний дараа давтагдах үзэгдэл явагдаж болох талтай юм байна.

8 §. Алгебрын шугаман тэгшитгэлийн системийн сөрөг биш шийдийг тодорхойлох арга

$$\begin{aligned}
 a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1j}x_j + \dots + a_{1n}x_n &= b_1, \\
 a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2j}x_j + \dots + a_{2n}x_n &= b_2, \\
 \dots &\dots \\
 a_{j1}x_1 + a_{j2}x_2 + \dots + a_{jj}x_j + \dots + a_{jn}x_n &= b_j, \\
 \dots &\dots \\
 a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mj}x_j + \dots + a_{mn}x_n &= b_m.
 \end{aligned} \quad (13)$$

гэсэн n хувьсагч бүхий m шугаман тэгшитгэлийн систем өгөгджээ. $b_i \geq 0$ гэж үзэх нь, асуудлыг үл мнхуруулна. (Хэрэв b_i сөрөг байвал тэр тэгшитгэлийн хойр талыг -1-ээр үржүүлж зэрэг болгож болно.

(13) системийг

$$0 = b_i - \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right), \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (22)$$

дүрстэй бичье. Хэрэв (22) системийн ямар нэг хувьсагч зөвхөн ганц тэгшитгэлд орсон бөгөөд энэ хувьсагчийн хаалтанд орсон үеийн коэффициент нь «+» тэмдэгтэй байвал тэр тэгшитгэлийг энэ хувьсагчийнх нь хувьд бодож огно.

(22) системийн тэгшитгэлүүд ийм хувьсагчийнхаа хувьд бодогдсон гэж санаа. Тэгвэл тэдгээр хувьсагчийг зохих ёсоор дутаарласны дараа өгөгдсөн систем

$$\begin{aligned}
 x_1 &= b_1 - (a_{110+1}x_{10+1} + a_{110+2}x_{10+2} + \dots + a_{1j}x_j + \dots + a_{1k}x_k), \\
 x_2 &= b_2 - (a_{210+1}x_{10+1} + a_{210+2}x_{10+2} + \dots + a_{2j}x_j + \dots + a_{2k}x_k), \\
 &\dots \\
 x_n &= b_n - (a_{n10+1}x_{10+1} + a_{n10+2}x_{10+2} + \dots + a_{nj}x_j + \dots + a_{nk}x_k),
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x_{i_0} &= b_{i_0} - (a_{i_0 i_0+1} + a_{i_0 i_0+2} x_{i_0+2} + \dots + a_{i_0 j} x_j + \dots \\
 0 &= b_{i_0+1} - (a_{i_0+1, i_0+1} x_{i_0+1} + a_{i_0+1, i_0+2} x_{i_0+2} + \dots \\
 &\quad \dots + a_{i_0+1, j} x_j + \dots + a_{i_0+1, k} x_k) \\
 0 &= b_m - (a_{m, i_0+1} x_{i_0+1} + a_{m, i_0+2} x_{i_0+2} + \dots \\
 &\quad \dots + a_{m j} x_j + \dots + a_{m k} x_k)
 \end{aligned}$$

дүрст шилжинэ. Эсвэл товчоор

$$\left. \begin{aligned} x_i &= b_i - \left(\sum_{j=l_0+1}^k a_{ij} x_j \right), \\ 0 &= b_l - \left(\sum_{j=l_0+1}^k a_{lj} x_j \right), \end{aligned} \right\} \quad (23)$$

хэмээн бичиж болно. Үүнд:

$$\begin{aligned}
 l &= 1, 2, \dots, l_0; \quad \gamma = 1, 2, \dots, \gamma_0; \\
 l_0 + \gamma_0 &= m; \quad l_0 + k = n; \quad b_l \geq 0; \quad b_l \geq 0
 \end{aligned}$$

(23) систем дэх аль нэг үл мэдэгдэхийнхээ хувьд бодогдоогүй тэгшитгэл бүрийг 0 тэгшитгэл гэж нэрлэе.

Тийнхүү алгебрын шутаман тэгшитгэлийн ямар ч системийг (23) дүрст оруулж болох ажээ.

(23) системийн сөрөг биш шийдийг олох зорилгоор дор дурдсан нөхцөлүүдийг хангаж чадах адилтгал хувиргалт хийе.

1. Сул гишүүн b_j нь тэгээс их байх тийм 0 тэгшитгэлийг эрж олъё. (Хэрэв тийм 0 тэгшитгэл байхгүй бол

$$x_i = b_i, \quad x_j = 0 \quad (l = 1, 2, \dots, l_0, \quad j = l_0 + 1, \dots, k)$$

утгууд (23) системийн сөрөг биш шийд байна) Тийм тэгшитгэл нь i дугаар тэгшитгэл болот.

2. i дугаар тэгшитгэлийн a_{ij} эерэг коэффициентийг сонгон авъя?

3. a_{ij} шийдвэрлэгч элементийг олж (23) системийг адилтгалаар хувиргая.

1 Хэрэв (23) системд аль нэг хувьсагчийнхаа хувьд болохдох нэг ч тэгшитгэл байхгүй бол $l_0 = 0$ байх ба уг систем дан ганц 0 тэгшитгэлүүдээс тогтсон байна.

2 Хэрэв i дугаар тэгшитгэлд эерэг коэффициент байхгүй бол (23) систем нийцгүй байна. Учир нь $0 = b_i - (\sum_{j=l_0+1}^k a_{ij} x_j)$ тэгшитгэлийн $b_i > 0$ бүх $a_{ij} < 0$ болохоор, энэ тэгшитгэлийг хангах $x_j \geq 0$ үгт-та үл олно.

4. i дугаар тэгшитгэлийг цаашдын хувиргалтад шилгээ. Тэрхдээ энэ тэгшитгэлд, бусад тэгшитгэлүүдэд ороогүй үл мэдэгдэх гарч ирэх үе хүртэл дугаар (23) системийн нийцгүй болохыг тогтоох хүртэл энэ тэгшитгэлийг ашиглана!

5. i дугаар 0 тэгшитгэлийг шийдсэний дараа эерэг сул гишүүнтэй өөр нэг 0 тэгшитгэлийг хайн олж, омнөхтэй төстэй үйлдлийг хийнэ.

6. Энэ үйлдлийг бүх 0 тэгшитгэлд барагдах хүртэл гүйцэтгэнэ.

1 талбар. Болож олсон хувьсагчийн илэрхийллийг бусад тэгшитгэлүүдэд тавихад зарим тэгшитгэл $0 = 0$ адилтгал болон хувирч болох тул тэрээр системийн бүрэлдэхүүнээс хасагдаж хувирсан систем дэх тэгшитгэлийн тоо m -ээс цөөн байж болно.

II талбар: (23) системд буюу эсвэл хувирсан системд ямар нэг хувьсагчийнхаа хувьд бодогдсон бөгөөд сул гишүүн нь тэгтэй тэнцүү, $x_i = 0 - (2\beta_i x_i)$ байхын гадна баруун талын бүх хувьсагчийн коэффициентүүд сөрөг биш байх тийм тэгшитгэл байх юм гэж авъя. Ийм хувьсагчдын утга тэгээс ялгаатай байж болохгүй. Учир нь x_i сөрөг биш байх ёстой. Иймд эдгээр хувьсагчийн тэг утгуудыг бусад тэгшитгэлүүдэд тавивал өгөгдсөн систем үлэмж хялбарчлагдана. Үүнд сул гишүүн нь тэгтэй тэнцүү, баруун тал дахь хувьсагчдын тэгтэй тэнцүү биш коэффициентүүд нь ижил тэмдэгтэй байх 0 тэгшитгэлүүдийг системийн бүрэлдэхүүнээс хасаж, тэдгээр хувьсагчдын бусад тэгшитгэлүүд дэх утгыг тэгтэй тэнцүүд тооцно.

1—6 нөхцөлийг хангаж чадах адилтгал хувиргалтуудын дараалал ямар үр дүнд хүргэж болохыг сонирхъё.

а) Төгсгөлтэй тооны адилтгал хувиргалт хийсний дараа өгөгдсөн систем тэг тэгшитгэлээс ангижирч олно. Энэ тохиолдолд (23) систем нийцтэй болох нь илт бөгөөд үндсэн биш хувьсагчдыг тэгтэй тэнцүүлж, үндсэн хувьсагчдыг сул гишүүнтэй нь тэнцүүлж олсон шийд нь 0 тэгшитгэл агуулаагүй системийн сөрөг биш шийд болж чадна.

1 Хэрэв i дугаар тэгшитгэлд эерэг коэффициент байхгүй бол (23) систем нийцгүй байна. Учир нь $0 = b_i - (\sum_{j=l_0+1}^k a_{ij} x_j)$ тэгшитгэлийн $b_i > 0$, бүх $a_{ij} < 0$ болохоор энэ тэгшитгэлийг хангах $x_i \geq 0$ утга үл олно.

б) Төгсгөлтэй тооны адилтгал хувиргалт гүйцэтгэсний дараа ашиглаж байсан тэг тэгшитгэл, маань

$$0 = b'_i - \left(\sum a_{ij} x_j \right)$$

дүртэй болох ба тэгэхдээ $b'_i > 0$, харин бүх j -ийн хувьд $a_{ij} \leq 0$ байж болох юм. Энэ тохиолдолд систем нийцгүй байна.

в) Адилтгал хувиргалтыг хичнээн ч хийсэн, өгөгдсөн систем 0 тэгшитгэлээс бүрмөсөн ангирахгүй тохиолдол байж болно. Адилтгал хувиргалтыг дэс дараалан хийхэд 0 тэгшитгэлийн тоо олсрохгүй учраас зарим нэг 0 тэгшитгэл, баруун талдаа ямагт ядаж нэг зэрэг коэффициенттой байх хирнээ шийдвэрлэгч элемент түүнд хэзээ ч үл харьяалагдах чанартай байж болно. Энэхүү

$$0 = b'_i - \left(\sum a_{ip} x_p \right)$$

0 тэгшитгэлийг $y = \frac{b'_i}{\epsilon} - \frac{1}{\epsilon} \left(\sum a_{ip} x_p \right)$ тэгшитгэлээр

сольж, энэ тэгшитгэлээ бусад бодогдсон тэгшитгэлүүдтэй хамтруулан үзвэл в) тохиолдолд давтагдах үзэгдэл явагдана гэдгийг олж үзэж болно. Үүнд ϵ нь хичнээн ч бага байж болох зөрөг тоо болой.

Ярилсан бүх зүйлүүд, дараах дүгнэлт хийх боломж өгч байна.

И хувьсагч бүхий m алгебрын тэгшитгэлийн ямар ч системд адилтгал хувиргалтыг дэс дараалан хийх явдал төгсгөлтэй тооны алхмын дараа (давтагдах үзэгдэл явагдахаас бусад тохиолдолд) өгөгдсөн систем сөрөг биш шийдийн мужид нийцтэй эсэхийг тодорхойлох боломж өгдөг. Хэрэв систем нийцтэй бол хувиргалтын сүүлчийн алхам дээр ямар нэг сөрөг биш шийд гарч ирдэг.

Дуудсан арлын чухал чанар нь түүнийг алгебрын тэгшитгэлийн дурын системд тэгшитгэлүүд нь шугаман хамааралтай эсэхийг харгалзахгүйгээр ашиглаж болдогт оршино.

Түүнээс гадна шугаман тэгшитгэл бишийн системийг нэмэлт сөрөг биш хувьсагч нэмэн оруулах замаар тэнцэтгэлийн системд шилжүүлж болдог тул дээрх арлыг тэнцэтгэл бишийн системийн нийцтэй эсэхийг тодорхойлох, мөн түүний сөрөг биш шийдүүдийн нэ

ийг олоход ашиглаж болно. Энэ үед шийдийн олонлогийг "дэврээр" ялган авах шаардлага бас ардана. 19 дүгээр зураг дээр алгебрын шугаман тэгшитгэлийн дурын системийн сөрөг биш шийдийг тооцон болох электрон машинаар тодорхойлох дамжлага загварыг харууллаа.

Машинд, эхлээд өгөгдсөн системийн хувьсагчдын коэффициентүүд ба сул гишүүд, мөн хамгийн бага утгыг нь олбол зохих шугаман хэлбэрийн коэффициентийг оруулна. Машин, программынхаа дагуу адилтгал хувиргалтыг дэс дараалан үйлдэж систем нийцтэй хийх нөхцөлийг шалтан үзнэ.

Хэрэв систем нийцгүй байвал энэ тухай машин долоо өгч ажиглалаагаа зогсооно. Хэрэв систем нийцтэй бол машин, сөрөг биш шийдийг тодорхойлж, (хэрэгтэй бол) түүнийг гарган өгөх ба дараа нь зохистой шийдийг олох ажилд орно.

Жишээ авч үзье.

$$\left. \begin{aligned} 1 \cdot x_1 + 3x_2 + 3x_3 &= 2, \\ 1 \cdot x_1 + 2x_2 + 4x_3 &= 7, \\ -3x_1 + 3x_2 + x_3 &= 3, \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} 0 &= 2 - (x_1 + 3x_2 + 3x_3) \\ 0 &= 7 - (x_1 + 2x_2 + 4x_3) \\ 0 &= 3 - (-3x_1 + 3x_2 - x_3) \end{aligned} \right\}$$



систем хувьсагчдынхаа сөрөг биш холбогдлын мужид нийцтэй эсэхийг тодорхойл.

Эхний 0 тэгшитгэл дэх x_1 -ийн зөрөг коэффициент нь шийдвэрлэгч элемент болж чадна.

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= 2 - (3x_2 + 3x_3) \\ 0 &= 5 - (-x_2 + x_3) \\ 0 &= 9 - (12x_2 + 8x_3) \end{aligned} \right\}$$

Хоёрдугаар 0 тэгшитгэлийн x_3 -ийн коэффициент сөрөг байгаа бсдговч шийдвэрлэгч элемент нэгдүгээр тэгшитгэлд харьяалагдаж байна.

$$\left. \begin{aligned} x_3 &= \frac{2}{3} - \left(\frac{1}{3} x_1 + x_2 \right) \\ 0 &= \frac{13}{3} - \left(-\frac{1}{3} x_1 - 2x_2 \right) \end{aligned} \right\}$$



системүүд тус тус үүснэ. Өгөгдсөн системийн сөрөг биш шийдүүдийн нэг нь

$$x_1 = \frac{1}{2}, x_3 = 1, x_2 = 0, x_4 = 0$$

болно.

Тэгшитгэлийн системийн сөрөг биш шийдийг олох энэхүү арга нь матрицийн рангийг тодорхойлох аргуудын нэг болж чадна. Учрыг тайлбарлахын тулд

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix}$$

матриц өгөгджээ гэж санав. Энэ матрицийнхаа багануудыг P_1, P_2, \dots, P_n векторууд гэж үзээд.

$$0 = P_0 - \left(\sum_{j=1}^n x_j P_j \right)$$

тэгшитгэл зохиоё. Үүнд; $P_0 = P_1$ гэж үзье.

Энэ тэгшитгэл сөрөг биш шийдтэй байх нь илт байна. (Жишээлбэл $x_1 = 1, x_j = 0, j = 2, 3, \dots, n$)

$0 = P_0 - \left(\sum_{j=1}^n x_j P_j \right)$ вектор тэгшитгэлийг m тэгшитгэ-

лийн систем дүрстэй болгож, энэ системээ адилтгал хувиргалаар хувиргаж 0 тэгшитгэлээс ангижруулна. 0 тэгшитгэлүүдийг зайлуулсны дараа үлэх шийдэгдсэн тэгшитгэлүүдийн тоо матрицийн рангийг тодорхойлно. Тэгэхдээ үйлдвэл зохих хувиргалтын тоо матрицийн рангатай тэнцүү байдгийг бас үзүүлж болдог.

Жишээ.

$$\begin{vmatrix} 2 & -4 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & 7 & 4 & -4 & 5 \end{vmatrix}$$

матрицийн рангийг ол.

Адилтгал хувиргалтыг дэс дараалан үйлдье.

$$\begin{cases} 0 = 2 - (2x_1 - 4x_2 + 3x_3 + x_4) \\ 0 = 1 - (x_1 - 2x_2 + x_3 - 4x_4 + 2x_5) \\ 0 = 0 - (x_2 - x_3 + 3x_4 + x_5) \\ 0 = 4 - (4x_1 - 7x_2 + 4x_3 - 4x_4 + 5x_5) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 1 - (-2x_2 + x_3 - 4x_4 + 2x_5) \\ 0 = 0 - (x_3 + 9x_4 - 4x_5) \\ 0 = 0 - (x_2 - x_3 + 3x_4 + x_5) \\ 0 = 0 - (x_2 + 12x_4 - 3x_5) \end{cases} \quad \text{I алхам}$$

$$\begin{cases} x_3 = 0 - (9x_4 - 4x_5) \\ x_1 = 1 - (-2x_2 - 13x_4 + 6x_5) \\ 0 = 0 - (x_2 + 12x_4 - 3x_5) \\ 0 = 0 - (x_2 + 12x_4 - 3x_5) \end{cases} \quad \text{II алхам}$$

$$\begin{cases} x_2 = 0 - (12x_4 - 3x_5) \\ x_3 = 0 - (9x_4 - 4x_5) \\ x_1 = 1 - 11x_4 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad \text{III алхам}$$

матрицийн ранг $r = 3$ ажээ.

9 §. Шугаман программчлалын бодлогыг бодох

Шугаман программчлалын бодлого нь

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1j}x_j + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2j}x_j + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{j1}x_1 + a_{j2}x_2 + \dots + a_{ji}x_j + \dots + a_{jn}x_n = b_j, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mj}x_j + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (13)$$

Энэ нь n хувьсагч бүхий m шугаман тэгшитгэлийн систем, мөн эдгээр хувьсагчаас хамаарсан $j = 1, 2, \dots, n$ шугаман хэлбэр өгөгдсөн систем үед (13) системийн бүх боломжтой сөрөг биш (x_1, x_2, \dots, x_n) шийдүүдийн дотроос f шугаман хэлбэр хэмжигийн бага утгатай байх тийм ($x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0$) шийдийг олоход оршино гэж өмнө томъёолсон билээ. Энэ бодлогыг бодохын тулд (13) системийн сөрөг биш нэгэн шийдийг өмнөх зүйлд дурдсан аргаар олж, дорныг хэрэглэсний дүнд (13) систем өөртөйгөө эн

$$b'_1 = (a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \dots + a'_{1j}x_j + \dots + a'_{1n}x_n) + \dots + a'_{1r}x_r + 1 + a'_{1r+1}x_{r+1} + \dots + a'_{1n}x_n,$$

$$\begin{aligned}
x'_2 &= b'_2 - (a'_{2r} + 1x'_{r+1} + a'_{2r+2}x'_{r+2} + \dots + a'_{2j}x'_j + \dots \\
&\quad \dots + a'_{2n}x'_n), \\
x'_i &= b'_i - (a'_{ir} + 1x'_{r+1} + a'_{ir+2}x'_{r+2} + \dots + a'_{ij}x'_j + \dots \\
&\quad \dots + a'_{in}x'_n), \\
x'_r &= b'_r - (a'_{rr+1}x'_{r+1} + a'_{rr+2}x'_{r+2} + \dots + a'_{rj}x'_j + \dots + \\
&\quad \dots + a'_{rn}x'_n), \\
i &= 1, 2, \dots, r; r \geq m; r+k \leq n.
\end{aligned}$$

системд шилжинэ¹. Үндсэн хувьсагчдын илэрхийллийг шугаман хэлбэрт тавьж, тогтмол хэмжигдэхүүнүүдийг зохих ёсоор тэмдэглэсний дараа f -ийг

$$f = F - \sum_{j=r+1}^n c_j x_j \quad (25)$$

шугаман функц дүрстэй болгож болно.

Симплекс арга ёсоор зохистой шийдийг олохыг тулд (24) систем ба (25) шугаман функцийг, адилтгал хувиргалтыг цаашид хэрэглэж болох нөхцөл алдгадаг хүртэл адилтгал хувиргалтаар хувиргаа. Өөрөөр хэлбэл (25) дахь зөрөг коэффициентүүд арилах хүртээ адилтгал хувиргалтаар хувиргаа. Энэ бүлгийн эхний хоёр зүйлд дурдсан давтагдах үзэгдэл нь шугаман программчлалын бодлогод бас хамаарах тул дор дурдсан дүгнэлтийг хийж болно.

Тэгшитгэлийн системийн шийдүүдийн дотроос шугаман хэлбэр хамгийн бага утгатай байх сөрөг биш шийдийг төгсгөлтэй тооны адилтгал хувиргалт (давтагдах үзэгдэл байхгүй үед) гүйцэтгэсний дүнд олж болно.

Давтагдах үзэгдэл байх боломжийг арилгах хэрэгсэл арга байдаг.

Эдгээр аргуудын зарим нь адилтгал хувиргалт гүйцэтгэх бүрийд, бөхөх үзэгдэл байх үеийн шиг нэмэлт үйлдэл шаарддаг. Бөхөх үзэгдэл байх үед шийдвэр дэгчлөгмент нэгэн утгатай тодорхойлогддоггүй. Бөхөх үзэгдэл байх үед адилтгал хувиргалтын алхам бүр

¹ Ил хувьсагчдыг зохих ёсоор дутаарласны дараа ийм системд шилжинэ.

шаардагдах нэмэлт үйлдэл нь давтагдах үзэгдлийг арилгаж чадахуйцаар шийдвэрлэгч элементийг сонгонших боломж өгдөг юм. P_0 вектор нэг буюу хэд хэдэн "уурь" хэт хавтгайд харьяалагдаж байх үед бөхөх үзэгдэл тохиолдоно гэж бүр дээр тэмдэглэсэн билээ. Шугаман программчлалын бодлогыг бодсон практик нэвчилгээний байдлыг шинжлэн үзвэл давтагдах үзэгдэл явагдах магадлал тун бага болох нь илэрсэн. Үүрчин давтагдах үзэгдэлтэй жишээ зохиоход олон тооны нэмэлт нөхцөл шаардагдах нилээд сүрхий бэрхшээл тулгардаг.

Бодлогыг гар аргаар бодох үед ховор дайралдаж тооцошгүй давтагдах үзэгдлийг шууд илрүүлж болдог.

$$x_1 = 0 - (x_3 - x_4 - x_5 + 3x_6)$$

$$x_2 = 0 - (2x_3 - x_4 - \frac{1}{2}x_5 + x_6)$$

системийн шийдүүдийн дотроос

$$f = 3 - (x_3 + x_4 + 3x_5 - 8x_6)$$

Шугаман хэлбэр хамгийн бага утгадаа хүрэх сөрөг биш шийдийг олох зорилго тавьж, 44 дүгээр хуудсанд үзүүлсэн жишээтэй адил адилтгал хувиргалт хийвэл, олж авсан үндсэн хувьсагчдаа буцаж ирснээ ажиг болно. Хэрэв үүнийг эс аявал бодлого бодовч ажиллани хичнээн ч үрэлжжиж болох боловч шугаман үзэгдэрийн утга тогтмол хэвээр үлдэх болно.

Хэрэв давтагдах үзэгдэл тохиолдовол өөр шийдвэрлэгч элемент сонгон авч адилтгал хувиргалтынхаа тус дарааг өөрчилнө. Дурдсан жишээгээ энэ аргаар тооцожрууилбал f шугаман хэлбэр доод таласаа хязгарилдаггүй болох нь дараах байдлаас харагдана.

$$x_1 = 0 - (x_3 - x_4 - x_5 - 3x_6)$$

$$x_2 = 0 - (2x_3 - x_4 - \frac{1}{2}x_5 + x_6)$$

$$f = 3 - (x_3 + x_4 + 3x_5 - 8x_6)$$

$$x_3 = 0 - \left(-\frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_4 - \frac{1}{4}x_5 + \frac{1}{2}x_6 \right)$$

$$x_4 = 0 - \left(-\frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_4 - \frac{3}{4}x_5 + \frac{5}{2}x_6 \right)$$

$$f = 3 - \left(-\frac{1}{2}x_2 + \frac{3}{2}x_4 - \frac{13}{4}x_5 - \frac{17}{2}x_6 \right)$$

Энэ тохиолдолд x_4 -ийн утгыг ихэсгэх замаар шүтмэл хэлбэрийн утгыг багасгаж болно. Учир нь x_4 хувьсагчийн коэффициентийн баганы дотор сөрөг коэффициент байхгүй, өөрөөр хэлбэл нэг ч шийдвэрлэгч элемент байхгүй тул x_4 -ийг ихэсгэхэд ямар ч хязгаар байхгүй. Ийнхүү f функц доросоо хязгаарлагдажээ.

Бодлогыг тооцон бодох электрон машинаар бодлогыг зохиохдоо өмнө дайралдсан бүлэг үндс хувьсагчтай дахин дайралдах боломжийг бодолцох хэрэгтэй. Давтагдах үзэгдэл илрэх бүрд, үүнийг арилгах нэмэлт үйлдэл бүхий программын хэсгийг маш ооруудад зохино.

Давтагдах үзэгдлийг арилгах хамгийн хялбар нэмэлт үйлдэл нь давтагдах үзэгдэл илэрсэн алхам дээр өөр шийдвэрлэгч элемент сонгон авах арга байдаг.

Жишээ. $f = 5x_1 - 10x_2 + 7x_3 - 3x_4$ шугаман функцийг

$$0 = \frac{7}{2} - (x_1 + x_2 + 7x_3 + 2x_4)$$

$$0 = \frac{3}{2} - (-2x_1 - x_2 + 3x_3 + 3x_4)$$

$$0 = 4 - (2x_1 + 2x_2 + 8x_3 + x_4)$$

системийн сөрөг биш шийдийн олонлог дээрх хамгийн бага утгыг ол.

Адилтгал хувиргалтыг зохих ёсоор үйлдвэл:

$$x_2 = 2 - (x_1 + 4x_3 + \frac{1}{2}x_4)$$

$$0 = \frac{3}{2} - (-2x_1 + 3x_3 + \frac{3}{2}x_4)$$

$$0 = \frac{7}{2} - (-x_1 + 7x_3 + \frac{7}{2}x_4)$$

$$x_3 = \frac{1}{2} - (-\frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{2}x_4)$$

$$x_2 = 0 - (\frac{11}{3}x_1 - \frac{3}{2}x_4)$$

$$0 = 0 - (\frac{11}{3}x_1) \quad (x_1\text{-ийн утга зөвхөн } 0 \text{ байх үед)}$$

$$x_3 = \frac{1}{2} - (\frac{1}{2}x_4)$$

$$x_2 = 0 - (-\frac{3}{2}x_4)$$

$$f = \frac{7}{2} - (\frac{43}{2}x_4)$$

$$x_4 = 1 - (2x_3)$$

$$x_2 = \frac{3}{2} - (3x_3)$$

$$f = -18 - (-43x_3)$$

$x_1 = 0, x_3 = 0, x_4 = 1, x_2 = \frac{1}{2}$ байх үед $f = -18$ Жишээ.

$$-20x_1 + 12x_2 - 15x_3 \leq 60$$

$$3x_1 + 2x_2 - 3x_3 \leq 6$$

$$-20x_1 - 15x_2 + 3x_3 \leq 60$$

$$10x_1 + 5x_2 - 2x_3 \geq 10$$

$$6x_1 + 7x_2 + 42x_3 \geq 12$$

шугаман тэнцэтгэл бишийн системийн сөрөг биш шийдүүдийн дотроос $f = x_1 + x_2 + x_3$ шугаман хэлбэр хамгийн бага утгатай байх тийм шийдийг ол.

Бодолт. Тэнцэтгэл бишийн системийг нэмэлт хувьсгачийн тусламжтай

$$y_1 = 60 - (-20x_1 + 12x_2 - 15x_3)$$

$$y_2 = 6 - (3x_1 + 2x_2 - 3x_3)$$

$$y_3 = 12 - (3x_1 + 6x_2 + 4x_3)$$

$$y_4 = 60 - (-20x_1 - 15x_2 + 3x_3)$$

$$0 = 10 - (10x_1 + 5x_2 - 2x_3 - y_5)$$

$$0 = 42 - (6x_1 + 7x_2 + 42x_3 - y_6)$$

системд шилжүүлж адилтгал хувиргалтаар хувиргая

$$x = 1 - (\frac{1}{7}x_1 + \frac{1}{6}x_2 - \frac{1}{42}y_6)$$

$$y_1 = 75 - (\frac{25}{7}x_1 + \frac{87}{6}x_2 - \frac{15}{42}y_6)$$

$$y_2 = 9 - (\frac{10}{7}x_1 + \frac{5}{2}x_2 - \frac{3}{42}y_6)$$

$$y_3 = 8 - (\frac{17}{7}x_1 + \frac{32}{6}x_2 + \frac{4}{42}y_6)$$

$$y_4 = 57 - (\frac{143}{7}x_1 - \frac{93}{6}x_2 - \frac{3}{42}y_6)$$

$$\begin{aligned}
0 &= 12 - \left(\frac{72}{7} x_1 + \frac{16}{3} x_2 - \frac{2}{42} y_6 - y_5 \right) \\
x_1 &= \frac{7}{6} - \left(\frac{14}{27} x_2 - \frac{7}{72} y_5 - \frac{1}{216} y_6 \right) \\
x_3 &= \frac{5}{6} - \left(\frac{5}{54} x_2 + \frac{1}{72} y_5 - \frac{5}{216} y_6 \right) \\
y_1 &= 95 \frac{5}{6} - \left(\frac{1383}{54} x_2 - \frac{665}{1512} y_5 - \frac{125}{72} y_6 \right) \\
y_2 &= 7 \frac{1}{3} - \left(\frac{95}{27} x_2 - \frac{10}{72} y_5 - \frac{14}{216} y_6 \right) \\
y_3 &= 5 \frac{1}{6} - \left(\frac{220}{54} x_2 + \frac{17}{72} y_5 + \frac{161}{1512} y_6 \right) \\
y_4 &= 80 \frac{5}{6} - \left(\frac{265}{54} x_2 - \frac{143}{72} y_5 - \frac{35}{1512} y_6 \right)
\end{aligned}$$

Тэнцэгтэл бишийн системийн сөрөг биш шийдүүдийн нэг нь $x_1 = \frac{7}{6}$, $x_2 = 0$, $x_3 = \frac{5}{6}$ юм. Одоо шугаман хэлбэрээ үндсэн биш хувьсагчдаар илэрхийлье. $f = 2 - \left(-\frac{7}{18} x_2 - \frac{1}{12} y_5 - \frac{1}{36} y_6 \right)$

Шугаман хэлбэрийн суулчийн энэ илэрхийллээс үзвэл түүнийг хувьсагчийнх нь сөрөг биш утгуудын мэдээлэлд цашид багасгах боломжгүй нь харагдаж байна. Ийм учраас $x_1 = \frac{7}{6}$, $x_2 = 0$, $x_3 = \frac{5}{6}$ гэсэн анхны шийд нь зохистой бөгөөд шугаман хэлбэрийн үүнд тохирох утга нь $f_{min} = 2$ байх болно.

10 §. Минимаксын нэгэн бодлогын тухай

m хэмжээт n ширхэг P_j вектор мөн эдгээрт харгалзан t_j бодит тоонуудын олонлог $T = \{t_j\}$ өгөгдөжээ. $j = 1, 2, \dots, n$

$$x_1 P_1 + x_2 P_2 + \dots + x_n P_n = P_0$$

тэгшитгэлийн бүх боломжтой сөрөг биш $y = \{x_j\}$ шийдийг $Y = \{y\}$ олонлогийг авч үзье. Үүнд P_0 нь m хэмжээт огторгуйд тодорхойлогдсон тэгтэй тэнцүү биш вектор юм.

Дурын y шийдүүдийн доторх $x_j \neq 0$ хувьсагчийг t_j -аар, тэдгээрт харгалзах t_j -үүдийг t_j -аар тус тус нэмдэгдэв.

$\{t_j\}$ -гээр y шийдийн доторх $x_j \neq 0$ -д харгалзах t_j -үүдийн системийг тэмдэглэе.

$\{t_j\}$ тоонуудын дотроос хамгийн ихийг нь t_y -ээр тэмдэглэе.

Тийнхүү

$$t_y = \max_j \{t_j\}$$

гэжээ. Одоо бүх боломжтой y -уу шийдүүдийн дотроос харгалзах t_y -гийн зохистой утга $t_{y_{\max}}$ нь

$$t_{y_{\max}} = \min_j \{ \max_j \{t_j\} \}$$

гэжээ.

$$t_{y_{\max}} = \min_j \{t_j\}$$

Энэ нөхцөлд тохирох y шийдийг (хэрэв ийм шийд олтох байвал) зохистой шийд гэж нэрлэх ба y_{\max} гэж тэмдэглэе. Ийм бодлогыг минимаксын бодлого гэнэ.

(Энэ бодлогын тухайн тохиолдол нь дараа IV бүлэгт тодорхой үзэх ачаа тээвэрлэлтийн зөвхөн цаг хугацаагаар бодогдох бодлого болно.)

$$\sum_{j=1}^n x_j P_j = P_0 \text{ вектор тэгшитгэлд харгалзах}$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad 1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq n$$

Энэ n хувьсагч бүхий m шугаман тэгшитгэлийн системийг тэгсгэлтэй тооны адилтгал хувиргалтаар хувиргавал дүнд зохистой шийд гарган авч болно.

Үүний тулд:

1. Өгөгдсөн системийн сөрөг биш нэгэн шийдийг олно.
2. Үндсэн x_i хувьсагчдын дотроос t_i -гийн t_i^{\max} -тай илшүү холбогдолд харгалзах хувьсагчийг олох

3. Үндсэн биш хувьсагчдын дотроос $t_j \geq t_i^{max}$

харгалзах x_j хувьсагчдыг хаях.

4. i дугаар мөрөн дэх Σ тэмдгийн дотроос a_{ij}^* эсрэг коэффициентийг олж, a_i^* шийдвэрлэгч элементийг тодорхойлон адилтгал хувиргалтыг үйлдэх.

5. (Хэрэв хэрэгцээтэй бол) энэ 4 дүгээр алхмыг хэд дахин давтах замаар x_i хувьсагчийг үндсэн хувьсагчийн бүрэлдэхүүнээс гаргаж, түүнийг цаашид ахиарлын гадна орхиж бөднө.

6. 2-5 хүртэлх алхмуудыг хувирсан системийг хувиргелтын тодорхой алхамд тохирох мөрийн бүр коэффициентүүд эсрэг биш болох хүртэл давтан хэрэглэж бөднө.

Энэ алхам дээр олдсон үндсэн шийд нь зохистой шийд байна.

Учрыг тайлбарлая. Тодорхой тооны адилтгал хувиргалтын дараа өгөгдсөн систем

$$x_{i1} = a_{i1} - (\sum_j a_{ij} x_j),$$

$$\dots \dots \dots x_{ik} = b_{ik} - (\sum_j a_{ij} x_j); \quad a_{ikj} \leq 0,$$

$$\dots \dots \dots x_{ip} = b_{ip} - (\sum_j a_{ij} x_j).$$

дүрстэй болох ба x_{ik} хувьсагчид t_i^{max} харгалзах юм гэж

санаа. Хэрэв $b_{ik} < 0$ байвал x_{ik} -г анхааралдаа авахаар байж нийцгүй систем гарган авна. (Хэрэв $b_{ik} = 0$ байвал 5б дугаар хуудсан дахь II тайлбар ёсоор $x_{ik} = 0$ гэж үзэх ба $a_{ikj} \geq 0$ байх бүх j -гийн хувьд $x_j = 0$ гэж бас үзэх ёстой).

Үүний дараагаар адилтгал хувиргалтаа цаашид үргэлжлүүлнэ).

III БҮЛЭГ

АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН БОДЛОГЫГ ЗӨВХӨН ӨРТӨГТЭЙ НЬ ХОЛБОЖ БОДОХ

Энэ бүлэгт шугаман программчлалын ердийн бодлогын нэгэн болох ачаа тээвэрлэлтийн бодлогыг авч үзнэ. Ачаа тээвэрлэх асуудлыг төлөвлөх үед энэхүү тээвэрлэлтийг хамгийн ашиг орлоготой гүйцэтгэх чанар зохихон байгуулах шаардлага гардаг. Зарим үед ачаа тээвэрлэлтийг хамгийн бага өртөгтөйтөөр тээвэрлэх төлөвлөгөө зохиох, зарим үед цаг хожих явдлыг гол болгож тээвэрлэлтийн бүх боломжтой төлөвлөгөөний дотроос, уул ачааг хэрэглэх газарт нь хам илүүдийн дотроос, уул ачааг хүртэж чадах тийм төлөвлөлийн ботино хугацаанд хүртэж чадах тийм төлөвлөлийг сонгож авах шаардлага бас гардаг.

Эхний бодлогыг ачаа тээвэрлэлтийн зөвхөн өртөлийн хувьд бодогдох бодлого, сүүлчийн бодлогыг зөвхөн цаг хугацааны хувьд бодогдох бодлого гэж тус тус нэрлэдэг.

(Эртгийн хувьд бодогдох бодлого нь шугаман программчлалын бодлогын тухайн тохиолдсг бөгөөд өмнөх бүлэгт үзсэн симплекс аргаар шийдвэрлэгдэж бөднө. Ийн уул бодлогын онцлогоос шалтгаалж түүнийг хослогийн арга гэж нэрлэдэг аргаар бодвол хялбар байдаг. Хэрэв ачаа явуулах ба хүлээн авах газруудын тоо цөөн байвал энэ бодлогыг нар аргаар бодож болох ба кириш явуулах ба хүлээн авах газруудын тоо олон болх үед тооцон бодох электрон машинаар бодохоос мөрг замгүй.

Жишээ нь ачаа явуулах газрын тоо 30, хүлээн авах газрын тоо 40 байх үед дурдсан бодлогыг «Стрела» машин 25—30 минутанд бодсон байна.

III бүлэгт ачаа тээвэрлэлтийн зөвхөн өртгийн хувь бодогдох бодлогыг бодох хослолын аргыг үзэх ба энэ бодлогыг тооцон бодох машин дээр бодох хялбарчилсан дамжлага загварыг харуулна.

11 §. Асуудлыг тавих нь

Ачаа тээвэрлэлтийн зөвхөн өртгийн хувьд бодогдох бодлогыг дараах маягаар томъёолж болно.

m ширхэг газраас ачаа явуулах ба n ширхэг газар хүлээн авах юм гэж санай. a_1, a_2, \dots, a_m -ээр ачаа явуулах газар тус бүрд байгаа нэгэн төрлийн ачааны тоо хэмжээг, b_1, b_2, \dots, b_n -ээр хүлээн авах газар тус бүр шаардгдах ачааны тоо хэмжээг тус тус тэмдэглэе. x_{ij} -гээр төлөвлөгөө ёсоор ачаа явуулах i дугаар газраас хүлээн авах j дугаар газарт хүргэх нэгж ачааны тоо хэмжээг c_{ij} -гээр энэхүү нэгж ачааны өртгийг тэмдэглэе.

i	b_1	b_2		b_j		b_n
a_1	$c_{11} x_{11}$	$c_{12} x_{12}$		$c_{1j} x_{1j}$		$c_{1n} x_{1n}$
a_2	$c_{21} x_{21}$	$c_{22} x_{22}$		$c_{2j} x_{2j}$		$c_{2n} x_{2n}$
a_i	$c_{i1} x_{i1}$	$c_{i2} x_{i2}$		$c_{ij} x_{ij}$		$c_{in} x_{in}$
a_m	$c_{m1} x_{m1}$	$c_{m2} x_{m2}$		$c_{mj} x_{mj}$		$c_{mn} x_{mn}$

Хоёрдугаар хүснэгт

Явуулах бүх m ширхэг газраас явуулсан ачааны тоо хэмжээ, хүлээн авах бүх n газруудад хэрэгцээтэй ачааны тоо хэмжээтэй тэнцүү юм гэж үзвэл

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j \quad (26)$$

нөхцөл биелэлтэй эсвэл. Ийм хэлбэрийн бодлогыг дугаар хүснэгт дүрстэйгээр бичиж байв. Сөрөг биш $x_{ij} \geq 0$ элементтэй

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i \quad (i=1, 2, \dots, m), \quad (26')$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j \quad (j=1, 2, \dots, n), \quad (26'')$$

нөхцөлд тохирох $m \times n$ эрэмбийн $x = (x_{ij})$ матрицийг ачаа тээвэрлэлтийн бодлогын шийд гэж нэрлэе. (26') нөхцөл нь ачаа явуулах i дугаар газрын бүх ачаа ашигласан болохыг үзүүлж байгаа ба (26'') нөхцөл нь хүлээн авах j дугаар газрын хэрэгцээ бүрэн хангагдсан гэдгийг харуулж байгаа юм. Бидний зорилго ачаа тээвэрлэлтийн нийт өртөг

$$C = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

хамгийн бага байх x_{ij} -гийн сөрөг биш утгуудыг тодорхойлоход оршино.

Матрицийн скаляр үржвэрийн тодорхойлоглыг ашиглан, ачаа тээвэрлэлтийн зөвхөн өртгийнхөө хувьд бодогдох бодлогыг бас өөрөөр томъёолж болно.

Сөрөг биш бодит C_{ij} элементтэй $C = (C_{ij})$ матриц олджээ. Матриц дүрстэй бичигдсэн бөгөөд (26') ба (26'') нөхцөлүүдэд тохирох X шийдүүдийн дотроос (X^*) скаляр үржвэр хамгийн бага утгатай байх шийдийг олгохыг шаардана. Энэ нөхцөлд тохирсон X матрицаар нэвтрхийлэгдэх шийдийг зохистой шийд гэж нэрлэе.

12 §. Ачаа тээвэрлэлтийн зөвхөн өртгөөр бодогдох бодлогын үндсэн шийд

(1) өгдсөн $C = (C_{ij})$ матриц, мөн дурын $X = (x_{ij})$ ($i=1, 2, \dots, m$) ($j=1, 2, \dots, n$) шийд-матрицийг авч үзье. Тэгэхдээ $m \leq n$ гэж бодъё. Хэрэв ийм биш байхад матрицийн мөр багануудын байртыг сольж болно.

Хэд хэдэн тодорхойлогтой танилцъя. i, j хос натурал тоог *дөрвөлжин* дөрвөлжинүүдийн дурын олонлогийг *хуримтлал* гэж, тус тус нэрлэе. $i_1 j_1, i_1 j_2, i_2 j_2, i_2 j_3, \dots$ дүрстэй дөрвөлжинүүдийн дарааллыг хэлжээ гэе.

$$i_1 j_1, i_1 j_2, i_2 j_2, \dots, i_l j_l, i_l j_1$$

дүрстэй хэлхээг *битүү хэлхээ* буюу *цикл* гэнэ. Наазах нь нэг цикл агуулсан хуримтлалыг циклт хуримтлал гэх ба нэг ч циклгүй хуримтлалыг циклгүй хуримтлал гэнэ.

i, j дөрвөлжин бүрд X шийд матрицийн зөвхөн ганц x_{ij} элемент мөн өртгийн C матрицийн зөвхөн ганц c_{ij} элемент тус тус харгалзана. Ийм учраас дөрвөлжин хуримтлал бүрийг түүнд харгалзах x_{ij} мөн c_{ij} хоёрын аль алиных нь хуримтлал гэж үзэж болно.

Битүү θ хэлхээний элементүүдийг цагийн зууны хөдлөлийн дагуу чигээр дугаарлаж сондгой дугаартай элементүүдийг хагас сондгой хэлхээ θ^c , тэгш дугаартай элементүүдийг хагас тэгш θ^m хэлхээ үүсгэж байна гэж ярицаж байхаар тогтёе.

Хагас сондгой хэлхээний C_{ij} элементүүдийн нийлбэрийг $\sum_{\theta^c} C_{ij}$ гэж, хагас тэгш хэлхээний C_{ij} элементүүдийн нийлбэрийг $\sum_{\theta^m} C_{ij}$ гэж тус тус тэмдэглэе.

Теорем. Тэгээс ялгаатай x_{ij} элементүүдээс тогтсон циклт хуримтлал бүхий ямарч X шийдийн хувьд $(CX) \leq (CX)$ байх U_{ij} элементүүдээс тогтсон циклгүй хуримтлал бүхий U шийд олдно. Тэгэхдээ U шийдийн тэгтэй тэнцүү биш элементийн тоо X шийдийн тэгтэй тэнцүү биш элементүүдийн тооноос цөөн байна. Баталгаа. X матрицийн тэгтэй тэнцүү биш элементүүд θ, i битүү хэлхээ үүсгэнэ гэж үзээд $\sum_{\theta^m} c_{ij}$ хоёр нийлбэрийг жишиж үзье. Энэ хоёрын нэг θ^c жишээлбэл $\sum_{\theta^m} C_{ij}$ нь $\sum_{\theta^c} C_{ij} \leq \sum_{\theta^m} C_{ij}$ байх ёстой θ, i хэлхээн дэх элементүүдийг

$$\begin{aligned} x'_{i,j_1} &= x_{i,j_1} + x_{ij}^{m_{11}}, \dots, x'_{i,j_l} = x_{i,j_l} + x_{ij}^{m_{1l}}, \\ x'_{i_1,j_2} &= x_{i_1,j_2} - x_{ij}^{m_{11}}, \dots, x'_{i_1,j_l} = x_{i_1,j_l} - x_{ij}^{m_{1l}}. \end{aligned}$$

дүрмээр хувиргах замаар $X = (x_{ij})$ матрицаас $X' = (x'_{ij})$ матриц үүсгэе. Үүнд: i_1, i_2, \dots, i_l, j нь X

i нь сондгой θ^c хэлхээний дөрвөлжинүүд, i_1, i_2, \dots, i_l, j хагас тэгш θ^m хэлхээний дөрвөлжинүүд бөгөөд x_{ij} нь хагас сондгой θ^c хэлхээний хамгийн бага элемент болой. Харин бусад i, j дөрвөлжинүүдийн хувьд $x'_{ij} = x_{ij}$ юм, гэж үзье.

x_{ij} элементийг θ хэлхээгээр шилжүүлэх замаар X матрицаас үүссэн X' матриц нь ачаа тээвэрлэлтийн тооллогын шийд бас болж чадна гэдгийг хялбархан ажиг болно. Тэгээс ялгаатай бүх x_{ij} элементүүдийн тоо X' матрицад наад зах нь нэгээр хорогдож ирнэ

$$(CX) = (CX) + \left(\sum_{\theta^c} c_{ij} - \sum_{\theta^m} c_{ij} \right) x_{ij}^{m_{11}}, \text{ байх тул } (CX) \leq (CX) \text{ байна.}$$

Ийм шийдүүдийг олох ажлыг цаашид үргэлжлүүлбэл тогтөлтэй тооны алхмын дараа тэгээс ялгаатай x_{ij} элементүүдийн дотор битүү θ хэлхээ байхгүй тийм U шийдэд хүрэх ба $(CU) \leq (CX)$ болж теорем батлагдана.

Мөрдлөг. Ядаж нэг зохистой шийд олохын тулд сөрөг биш x_{ij} элементүүдээс тогтсон циклгүй хуримтлал бүхий бүх боломжтой X шийдийг үзвэл хүрэлцээтэй юм.

Тэгээс ялгаатай x_{ij} элементүүд нь циклгүй хуримтлал үүсгэх матриц дүрстэй илэрхийлэгдэх X шийд бүхнийг үндсэн шийд гэнэ.

Ирөнхийдөө, шийдийг дүрсэлж байгаа X матрицийн тэгээс ялгаатай элементүүдийн тоо янз бүр байж болох боловч ямар ч X шийдийн дотор n -ээс цөөнгүй тооны тэгээс ялгаатай элемент байх нь 11 §-ийн (26') нөхцөлөөс бас харагдаж байна. Нөгөө талаас дараах теорем бас хүчин төгөлдөр байдаг.

Теорем. Дурын үндсэн шийд дэх тэгтэй тэнцүү биш x_{ij} элементүүдийн тоо N нь $n \leq N \leq n + m - 1$ тэнцэтгэл бишийг хангана. Үүнд n нь ачаа явуулах газрын тоо, m нь ачаа хүлээн авах газрын тоо болно.

Баталгаа. Эхлээд хоёр дөмтэй танилцъя. $(m+n)$ амжааст огторгуйд $m \times n$ ширхэг вектор байгуулж, түүгээрийг $C = (c_{ij})$ матрицийн i, j дөрвөлжинүүдийн

олонлогт харилцан нэгэн утгатайгаар харгалзууль i, j дөрвөлжинд i ба $m + j$ дугаар байгуулагч нь нэгтэй тэнцүү, бусад нь тэгтэй тийм $P_{i,j}$ векторыг харгалзууль. Тэгвэл дөрвөлжинүүдийн хуримтлал бүр векторуудийн ямар нэг дэд олонлог тохирох ба мөрүүдээр векторуудийн ямар нэг дэд олонлогт дөрвөлжинүүдийн ямар нэг хуримтлал харгалзах нь илэрхийлэгдэнэ.

1 дүгээр лемм. Хэрэв $\{P_{i,j}\}$ векторуудийн олонлог шугаман хамааралтай байвал харгалзсан дөрвөлжинүүдийн хуримтлал циклтэй байна.

$\{P_{i,j}\}$ векторуудийн олонлогийг шугаман хамааралтай гэж бодвол ядаж нэг коэффициент нь тэгээс ялгаатай бөгөөд $q(0, 0, \dots, 0)$ тэг векторг хүрэх шугаман эвчлүүлэгч олдох ёстой. Энэ эвчлүүлэгч орсон тэгээс ялгаатай коэффициентүүд бүхий векторуудийг авч үзье. Ийм вектор нь жишээлбэл $P_{i,j}$ болог. Нэгтэй q векторын бүх байгуулагчид тэгтэй тэнцүү болохоор түүний шугаман эвчлүүлэгч орсон $P_{i,j}$ векторын i дүгээр байгуулагчийг тэг болгож хувиргахын тулд нэг зах нь яг ийм, тэгтэй тэнцүү биш байгуулагчид нэг вектор шаардагдана. Иймд энэхүү шугаман эвчлүүлэгч i тэмдэгтэй жишээ нь $P_{i,j}$ вектор заавал орсон байж таарна. Одоо нэгэн i_2 байгуулагчтай вектор шугаман эвчлүүлэгч орсон болохоор мөн шалтгаанаар P_{i_2,j_2} гэсэн, ядаж нэг вектор уул эвчлүүлэгч орно. Ийм маягаар сэтгэсний дүнд $P_{i_1,j_1}, P_{i_2,j_2}, P_{i_3,j_3}, \dots$ векторуудийн дарааллыг гарган авна.

Бидний мэдэлд төгсгөлтэй тооны вектор байх болохоор ямар нэг төгсгөлтэй тооны алхмын дараа $P_{i,j}$ векторг хүрэх ба энэ векторээс $P_{i,j}$ вектор шилжинэ. Векторуудийн энэ дараалалд дөрвөлжинүүдийн

$$i_1j_1, i_1j_2, i_2j_2, i_2j_3, \dots, i_1j_1, i_1j_2,$$

гэсэн циклт хуримтлал харгалзана.

2 дугаар лемм. $m + n$ дөрвөлжинөөс тогтсон n римтлал бүр циклтэй байна.

Энэ леммийг нотлохын тулд бидний байгуулсан векторуудийн дотроос дурьд $(m + n)$ ширхэг векторууд шугаман хамааралтай байна гэдгийг үзүүлдэг хангалттай юм.

Үүнийг нотолъё.

$$m \text{ ширхэг} \quad n \text{ ширхэг} \\ Q(-1, -1, \dots, -1; +1, +1, \dots, +1).$$

гэсэн $(n + m)$ хэмжээст вектор авъя. Энэ вектор бүх $P_{i,j}$ вектортой тоонолжин байна. Иймд бүх $P_{i,j}$ векторууд $m + n - 1$ хэмжээст огторгуйд харьяалагдана. Ийм учраас тэдгээрийн аль ч $m + n$ ширхэг вектортой шугаман хамааралтай байна. 11 § дахь (26') нөхцөл ба үүнийн лемм ёсоор $n < N < m + n$ байх болно. Харин $N = n$ мөн $N = m + n - 1$ байх бодлого байдгийг дэлгэрээр шууд үзүүлж болдог тул N тоо үнэхээр $n < N < m + n - 1$ нөхцөлд тохирох болно. Теорем бүрийг нотлогдов.

$m + n - 1$ дөрвөлжинөөс тогтсон циклтүү хуримтлалд харгалзах $\{P_{i,j}\}$ векторуудийн олонлог бидний байгуулсан $P_{i,j}$ -векторууд $(m + n)$ хэмжээст огторгуйд суурь үүсгэж чадах нь өмнө нотолсон леммээс илт байна. $m + n - 1$ дөрвөлжинөөс тогтсон дурьд циклтүү хуримтлалыг H -аар тэмдэглэе.

$m + n - 1$ хэмжээст огторгуйн бүх боломжтой сууриуд, $m + n - 1$ дөрвөлжинөөс тогтсон циклтүү хуримтлалын хоорондох харилцан нэгэн утгатай тохироцлог ашиглаж, олон хэмжээст огторгуйн суурийн чанарыг $m + n - 1$ дөрвөлжинөөс тогтсон циклтүү хуримтлалд шилдүүлэн дараах маягаар томьёолж болно.

1 дүгээр чанар. $m + n - 1$ дөрвөлжинөөс тогтсон циклтүү хуримтлал нь H_1 бөгөөд $(ij) \in H_1^*$, гэж саншид (ij) -г хуримтлалд нэгтгэсний дүнд үүсэх H_2 хуримтлал нь зөвхөн ганц θ циклтэй байна.

2 дугаар чанар. $(i', j') \neq (i, j)$ ба $(i', j') \in \theta$ байвал ij хуримтлалаас (i', j') дөрвөлжинийг зайлуулахад үүсэх H_3 хуримтлал $m + n - 1$ дөрвөлжинөөс тогтсон циклтүү хуримтлал байна.

1 ба 2 дугаар чанаруудад яригдсан H_1, H_2, H_3 хуримтлалууд нь нэг нь нөгөөгөөсөө ганцхан дөрвөлжинөөр ялгаатай.

Тодорхойлолт. Бие биесээ ганихан дөрвөлжинээр ялгагдах хоёр циклтүү $m + n - 1$ хуримтлалыг нэгэн солилцооор үүсэх циклтүү $m + n - 1$ хуримтлал гэнэ.

* E тэмдэг нь ij дөрвөлжин H_1 хуримтлалд үл харьяалагдана гэдгийг тэмдэглэнэ.

Дурын үндсэн $X = (x_{ij})$ шийдийг авч үзвэл 71 д тээр хуудсан дахь теорем ёсоор тэгээс ялгаатай элементүүдийн тоо N нь $n \leq N \leq n + m - 1$ нөхцөл тохирох ба шийдийн бусад $m \times n - N$ элементүүд тэгтэй тэнцүү байна.

X шийдийн тэгтэй тэнцүү биш x_{ij} элементүүд агуулсан дөрвөлжнүүд бүхий циклгүй $m + n - 1$ хуримтлал H -ийг байгуулъя.

Тодорхойлолт. X шийдийн циклгүй $m + n - 1$ хуримтлалын дөрвөлжнүүдэд орших тэгтэй тэнц элементүүдийг сонгож авсан тэгүүд гэж нэрлэнэ.

Тодорхойлолт. Циклгүй $m + n - 1$ H хуримтлалыг үүсгэж буй X үндсэн шийдийн тэгтэй тэнцүү биш x_{ij} элементүүдийг, сонгон авсан тэгүүдтэй хамтатган сонголт гэж нэрлэнэ.

Тодорхойлолт. X сонголтын элементүүд харгалзах C матрицийн c_{ij} элементүүдийг x -сонгогдсон элементүүд гэнэ.

Иймд, сонголт нь тэгтэй тэнцүү биш $x \neq 0$ элементүүдийн олонлогийг циклгүй $m + n - 1$ H хуримтлал үүсгэх хүртэл гүйцээж байгаа $x_{ij} = 0$ элементүүдийг ялгаж чадсан тийм үндсэн шийд юм. Хамгийн эцэс ядаж нэг зохистой шийд олохын тулд бүх боломжтой сонголтуудыг авч үзвэл хүрэлцээтэй юм гэдэг дүгнэлтэнд хүрч байна.

13 §. Зохистой сонголт

Ямар нэг анхны сонголтоос эхэлж, (C, X) скаляржвэр арай бага утгатай байх өөр нэг сонголт одоо дараалан шилжих замаар төгсгөлтэй тооны алд хийсний дараа зохистой шийдэд хүрдэгт зохистой шийд олох аргын мөн чанар оршино. Иймд анхны сонголыг хэрхэн байгуулах тухай асуудал гарах нь зөв. Анхны сонголт байгуулах дор дурдсан аргатай нилцъя.

Эхлээд $X = (x_{ij})$ матрицийн эхний мөрийн элементүүдийг тодорхойлъя. Үүний тулд $C = (c_{ij})$ матрицын анхны мөрийн хамгийн бага элементийг хайж олох энэ нь c_{11} болдог. Тэгээд $x_{11} = \min(a_1; b_1)$ гэж авч. Хэрэв $a_1 > b_1$ байвал C матрицийн мөн тэр рөөс $c_{12} \geq c_{11}$ нөхцөлд тохирсон хамгийн бага элементийг хайж олох ба $x_{12} = \min(a_1 - x_{11}; b_2)$

олно. Энэ алхмыг нэгдүгээр $a_1 = \sum_{j=1}^n x_{1j}$ тэгшитгэлийг бүрэн хангах хүртэл үргэлжлүүлнэ. Хэрэв энэ процессийн ямар нэг алхам дээр a_i -ийн үлдэгдэл, харгалзах b_{1k} -тайгаа яг тэнцүү байвал x_{1k} -г энэ үлдэгдэлтэй тэнцүүлж $(x_{1k} = b_{1k})$ дараагийн x_{1k+1} хувьсагчийн утгыг тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ. Үүний дараагаар ноёр, гурав гэх мэтчилэн цаашдын мөрүүдэд шилжин орхж жишээгээр ажиглана. Харгалзах тэгшитгэлээр бүрэн хангасан багануудад тэг бичихгүй.

Байгуулалтаас үз-

a_i	b_j	5	10	20	15
10	1	8	3	5	2
15	2	5	10	0	7
25	3	7	9	20	3

3 дугаар хүснэгт

үү хэлхээ алга байна.

Дээр өгүүлсэн бүх зүйлийг тодруулахын тулд жишээ авч үзье. 3 дугаар хүснэгтээр илэрхийлэгдсэн матрицаар тодорхойлогдох ачаа тээвэрлэлтийн боцлогын шүүмш шийдийг байгуулах зорилго тавья.

Нэгдүгээр мөрөнд $(8, 3, 5, 2)$ тоонуудын хамгийн бага нь 2 байгаа тул $x_{14} = \min(10, 15) = 10$ гэж авна. Нэгдүгээр ачаа явуулах нэгдүгээр газрын бүх ачаа дууссан тул хоёрдугаарт явуулах газрын ачааг хуваарилах ажилд оръя. Үүний тулд 3 дугаар хүснэгтийн хоёрдугаар мөрөн дэх $(4, 1, 6, 7)$ тоонуудын хамгийн багт олох нь 1 юм. Иймд $x_{22} = \min(15, 10) = 10$ байх ажээ. Явуулах хоёрдугаар газарт $15 - 10 = 5$ нэгж хэмжээний үлдэгдэл ачаа байгаа тул хоёрдугаар мөрнөөс хоёр дахь хамгийн бага элементийг хайж олно. Энэ нь 4 байна. Тэгвэл $x_{21} = \min(15 - 10, 5) = 5$ байх ёстой. Хүлээн авах нэгдүгээр газрын шаардлага бүрэн хангагдсан, мөн явуулах хоёрдугаар газарт ачаа үлдээгүй байдлыг харгалзан хоёрдугаар мөрөн дэх гурав дахь хамгийн бага элементийг олобол 6-тай тэнцүү байна. Иймд $x_{23} = 0$ гэж авч. Одоо явуулах гуравдугаар газрын ачааг хуваарилах. Энэ зорилгоор гуравдугаар мөрний $(1, 9, 4, 3)$ тоонуудын хамгийн багт олъё. Хүлээн авах нэгдүгээр газрын хэрэгцээ бүрэн хангагдсан учраас гуравдугаар

гаар мөр нэгдүгээр баганын огтлолцол дээр орших 1-анхааралдаа авахгүй байж болно. Ийм учраас $(9, 25, 15-10) = 5$ гэж авна. Үүний дараа гуравдугаар рөн дэх дараачийн бага тоо болох 4-ийг олж, $x_{33} = 4$ гэж болно.

Ийнхүү таргаж авсан хуваарилалт шийд мөн болж илт байна. Түүнээс гадна энэ шийд нь бас сонголт $m + n - 1 = 3 + 4 - 1 = 6$ байгаа бөгөөд эдгээр нь өөр хоорондоо цикл үүсгээгүй байна.

Нөгөө талаас сонголтонд ороогүй x_{ij} элемент сонголтын элементүүдтэй нийлж зөвхөн ганц ций үүсгэх нь илт байна.

Бид, анхны шийдийг олох дурдсан аргыг цааш баримтлах болно.

Одоо H_1 хуримтлалтай анхны сонголт X_1 шийд олсон бөгөөд харгалзах скаляр үржвэр (C, X_1) C_1 -тэй тэнцүү юм гэж санаад H_1 -д ороогүй C_{ij} элемент бүрийг

$$\Delta_{ij} = \sum_{\theta \in C} (c_{ij}) - \sum_{\theta \in C} (c_{ij})$$

илэрхийллийн тусламжтайгаар үнэлэн үзье. Үүнийг $\sum_{\theta \in C} c_{ij}$ нь харгалзан c_{ij} элемент бүр x -ээр сонгогдсон элементүүдтэй нийлж үүсгэх ганцхан бит хэлхээний сондгой ба тэгш хагасын элементүүдтэй нийлбэр болно. (Үнэлэн үзэж буй c_{ij} элементийг хэлхээний анхны элемент болгон авна). Хамгийн бага Δ_{ij} үнэлэлтэд харгалзах c_{ij} элемент, мөн энэ элементийн x -ээр сонгогдсон элементүүдтэй хамтарч үүсгэн битүү хэлхээг анхааралдаа авъя. Хоёрдугаар сонголт x_2 -ыг олох зорилгоор нэгдүгээр сонголт хамгийн бага элемент x_{ij}^{min} -ийг тэгш хагас хэлхээний сондгой уруу нь шилжүүлбэ. Энэ үед хэрэв тэгш хагас хэлхээнд x_{ij}^{min} -тэй тэнцүү хэд хэдэн x_{ij} элементүүд байвал, уул хэлхээг цагийн зүүний хөдлөлд дагуу тойроход эхлээд дайралдах x_{ij}^{min} элементийг агуулсан дөрвөлжинг H_1 хуримтлалаас зайлуулах маар хамгийн бага элементийг тодруулж болно.

хуримтлалаас зайлуулалдсан i, j дөрвөлжин оронд c_{ij} шинэ сонголтын $x_{ij} = x_{ij}^{min}$ элементүүд харгалзах i, j дөрвөлжинг оруулъя. (x_{ij}^{min}) элементийг хэлхээ дээгүүр гүйцэтгэсний дүнд x_2 сонголтонд хэд хэдэн тэг элемент гарч болно. X_2 сонголт нь X_1 сонголтоос хэлхээн дэх c_{11} элементийг хувиргасан өөрчлөлтөөр ялгагдах болохоор хэрэв $\sum_{\theta \in C} (c_{ij}) - \sum_{\theta \in C} c_{ij} < 0$ шпэтгэл биш биелэгдэж байвал (C, X_2) скаляр үржвэр (X, C_1) скаляр үржвэрээс $\left[\sum_{\theta \in C} (c_{ij}) - \sum_{\theta \in C} c_{ij} < 0 \right]$ хэмжээгээр бага байна. x_{ij}^{min} тэгтэй тэнцүү байх сонголт тул $C_1 \geq C_2$ байх ёстой гэсэн дүгнэлтэнд хүрнэ. Саяын дурдсан сонголт байгуулах аргыг давтаж, сонголтоос эхлэн X_3 сонголтыг байгуулах жишээг өмнөх ажиллагааг цашид үргэлжлүүлж болно. Энэ үүх ба тэдгээр харгалзах скаляр үржвэрүүдийн утгын дараалал $C_1 \geq C_2 \geq \dots \geq C_k \geq \dots$ сонголтын үүх арихад үл өсөх функц байна.

Хэрэв H_k хуримтлалд ороогүй c_{ij} элемент бүр сөрөг биш $\Delta_{ij} \geq 0$ үнэлэлтэй байвал тийм H_k хуримтлалд X_k сонголтыг зохистой сонголт гэнэ. H_k хуримтлалд ороогүй c_{ij} элемент бүхний хувьд $\sum_{\theta \in C} (c_{ij}) -$

$\sum_{\theta \in C} c_{ij} \geq 0$ тэнцэтгэл биш хүчин төгөлдөр байдалд

болохоор нэгэн удаагийн солилцоор X_k сонголтоос өөр аль ч сонголтод шилжих шилжилт нь скаляр үржвэрийн хэмжээг X_k сонголтод харгалзах скаляр үржвэрийн C_k хэмжээнээс багасгаж чадахгүй

Төгсөж. $a_i > 0, v_i > 0$ үед бодит элементтэй (c_{ij}) матрицын хувьд X_1, X_2, \dots, X_k сонголттай дараалал төгсгөлтэй тооны алхмын дараа зохистой сонголтоор төгсөнө.

Баталгаа. 1 тохиолдол. Хэрэв сонголтоос сонголт шилжиж X_1, X_2, \dots дарааллыг байгуулах үед зохистой сонголт нь мөн зохистой шийд болж чадна гэдгийг харуулъя.

аль ч алхам дээр нь $x_{ij} = 0$ гарч ирэхгүй бол хэлхээгээр шилжин явах x_{ij}^{min} элемент тэгээс ялгаатай байх. Энэ тохиолдолд скаляр үрвэрийн хэмжээ алхам тутам багасна. m, n хоёр төгсгөлтэй байх үед тус бүр явдал нэг сонголтыг нэгэн утгатай тодорхойлох H хуримтлалын тоо төгсгөлтэй байх учир сонголт хийх аргын тоо томшгүй олон байж болохгүй.

II тохиолдол. Хэрэв сонголтос сонголтод шилжих үед x_{ij} -ийн тэг утга гарч ирвэл X_1, X_2 дараа төгсгөлтэй болох нь хүмүүст эргэлзээ төрүүлж болно. Учир нь энэ үед $x_{ij}^{min} = 0$ байх ба скаляр үрвэрийн хэмжээ үл хорогдоно. Гэвч, ачаа тээвэрлэлтийн анхны бодлогын зэрэгцээ $C = (c_{ij})$ матрицтай болох

$$a'_i = a_i + \varepsilon, \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

$$b'_j = b_j, \quad j = 1, 2, \dots, (n-1),$$

$$b'_n = b_n + m\varepsilon,$$

байх хоёр дахь бодлогыг авч үзвэл дээрх эргэлт арилж болно. Үүнд ε нь зохих хэмжээний бага эерэг тоо юм. Энэхүү хоёр дахь бодлогыг ε бодлого гэнэ. Энэ хоёр бодлогын эхний X_1 ба X_1^e сонголтыг олгоё. Нэгэнт ε нь хурьцлэхгүйн бага тоо болохоор H_1, H_1^e хуримтлалууд давхцах ба X_1^e сонголтонд элемент $x_{ij}^e = 0$ гарч ирэхгүй. Учир нь мөр баганууд хооронд

$$\sum_{i=1}^{i=lp} a_i = \sum_{j=1}^{j=jp} b_j.$$

$$a) \quad \sum_{i=1}^{i=iq} a_i + q\varepsilon = \sum_{j=1}^{j=jp} b_j,$$

$$б) \quad \sum_{i=1}^{i=iq} a_i + q\varepsilon = \sum_{j=1}^{j=jp} b_j + b_n + m\varepsilon.$$

тэнцэтгэлээр илэрхийлэгдэх хослол байгаа үед дүгээр бодлогын сонголтонд тэгтэй тэнцүү x_{ij} элемент гарч ирдэг билээ. Иймд x_{ij} -ийн тэг утга

хоёр тохиолдолд гарч ирнэ. ε -ыг а), б) нөхцөлүүдээр илэрхийлэгдэх тэгшитгэлийн язгууртай тэнцэхүйцээр сонгон авч чадвал X^e сонголтонд тэг элемент гарч ирэхгүй. Нэгэнт $C = (c_{ij})$ матриц хоёр бодлогонд ижил болохоор хамгийн их сөрөг үнэлэлттэй c_{ij} элементүүд, мөн эдгээр элементүүд X_1 ба X_1^e сонголтын элементүүдтэй нийлж үүсгэсэн битүү хэлхээнүүд, бас үүсгэсэн дээгүүр шилжүүлдэг $x_{ij}^{min}, x_{ij}^{min}$ элементүүдийн H_1, H_1^e сонголт дахь байрлал цөм давхцана. Анхны бодлогод X_1 сонголтоос X_{2-m} шилжих шилжилт ε бодлого дахь X_1^e сонголтоос X_1^e -д шилжих шилжилт юм. ε хурьцлэхгүйн бага болохоор ийнхүү сэтгэх нь аль ч алхам дээр хүчин төгөлдөр байна. Нэгэнт ε бодлого нь скаляр үржвэр алхам бүрийд багасдаг $x_{ij} = 0$ утга байхгүй үеийн бодлого болохоор төгсгөлтэй тооны алхамын дараа ε бодлогын хувьд X_k^e гэсэн зохистой сонголтонд хүрнэ.

г) (c_{ij}) матрицууд мөн H_k, H_k^e хуримтлалын хувьд ийнхүүнээс үчир x_k нь мөн зохистой сонголт болж байна.

Ийнхүү теорем батлагдлаа.

14 §. Өртгийн матрицийг эн чацуугаар хувиргахад сонголтын дараагааг хэвээрээ үлдэх тухай

Элементүүдийн үнэлэлтийг тодорхойлох ажил их ажлынхны тооцон бодох ажиллагааг шаарддаг. Сонголтын дараааааг өөрчлөхгүйгээр, зохистой сонголтонд ажиллагааг үлэмж хэмжээгээр хялбарчилж чадах үндсэн $C = (c_{ij})$ матрицийн хялбар хувиргалтыг олох зорилгоор матрицийн эн чацуу хувиргалтын үндсэн ухагдахуунтай танилцъя.

Тодорхойлолт. $C = (c_{ij})$ матриц, мөн $r_1, r_2, \dots, r_n, s_1, \dots, s_n$ гэсэн дурын тоонууд өгөгджээ. Хэсэг (d_{ij}) матриц C матрицаас

$$D = (c_{ij} + r_i + s_j)$$

томбоогоор гарч ирэх тэдгээрийг эн чацуу матрицууд гэнэ.

Теорем. Матрицын эн чацуугаар хувиргах сонголтын дараалал хэвээр үлдэнэ.

Баталгаа. C матрицийг түүнтэй эн чацуу D матриц болгон хувиргав. C матрицаар X_1 сонголтыг оо түүнээсээ уламжлан нэг удаагийн солилтын зама зохистой сонголт X_k дээр нийлэх X_1, X_2, X_3, \dots рaalлыг байгуулъя.

X_1 сонголтаас уламжлан D матрицаар зохистой сонголтад нийлэх X_1, X_2, X_3, \dots дараалал бас ба туулья. X_1 сонголтад ороогүй дурын хоёр C_{ij}^c элементүүдийн үнэлэлтийн $\Delta_{ij}^c - \Delta_{ij}^D$ ялгавар тэгт тэнцүү болохыг хялбархан харуулж болно.

$$\begin{aligned} V_{ij}^c - \Delta_{ij}^D &= [\sum_{\theta c} (c_{ij}^c) - \sum_{\theta c} (c_{ij}^D) + r_i + s_j] - \\ &= [\sum_{\theta c} (c_{ij}^c) - \sum_{\theta c} (c_{ij}^D) - [\sum_{\theta c} (c_{ij}) - \sum_{\theta c} (c_{ij}^D)] - \\ &\quad - \sum_{\theta c} (r_i + s_j) + \sum_{\theta c} (r_i + s_j)] = 0. \end{aligned}$$

Сүүдчийн хоёр нийлбэр хэмжээгээрээ адил боловч рэг тэмдэгтэй байна. Учир нь сондгой хагас хэлхээ орсон бүх r_i (эсвэл s_j) тоонууд бас тэгш хагас X хээнд орно. Нэгэнт C ба D матрицын элементүүд үнэлэлт ижилхэн болохоор хамгийн бага үнэлэлт элементүүд нь бас ижил байх ёстой. Ийм учраас C D матрицын аль аины хувьд X_1 сонголтаас дараат сонголтад шилжихэд ижилхэн X_2 ба X_3 сонголт нэ. Ийм маягаар сэтгэх явдал аль ч адхмын хувьд чин төгөлдөр байна.

Энэ нь X_1, X_2, \dots, X_k сонголтын дараалал рицийг эн чацуугаар хувиргах үед үл өөрчлөгдө тэдгийг тэрчилж байна. Теорем батлагдлаа.


C матрицийг нэг биш удаа эн чацуу хувирга дээрх баталгаа хүчин төгөлдөр байх нь илт байн. Ямар ч хувиргалтын элементүүд өөр хоорон битүү хэлхээ үүсгэхгүй учир X -ээр сонгогдсон ментүүдийг тэг болгон хувиргах эн чацуу хувир тыг алхам бүр дээр хийж болох юм. Үүний тулд шээ нь, багана (мөр) тус бүрийн элемент дээр (багана) дээр нэмсэн тоо X -ээр сонгогдсон бөгөөд болгон хувиргавад зохих элемент хоёрын алгеб нийлбэрт эсрэг тэмдэгтэй тоонуудыг нэмбэл ханг тай юм.

X -ээр сонгогдсон тэг элементүүд агуулсан матри цийн X -ээр сонгогдоогүй элементийнх нь үнэлэлт, тэр- үү элементтэйгээ тэнцүү байдаг. Ийм учраас элемент- үрийн үнэлэлтийг тодорхойлох нүсэр их ажиллагаа үл гширдагдана. Дараачийн сонголтыг байгуулахын тулд- лагийн их сөрөг (туйлын хэмжээгээрээ) элементийг- ийбол хангалттай юм. Хэрэв хувирсан матриц X -ээр- сонгогдсон тэг элемент агуулсан бөгөөд бүх элемен- тууд нь сөрөг биш байвал түүнд тохирох сонголт зо- хистой байна. Матрицийн дарааллын инвариант чанар нь зохистой сонголт мөн зохистой шийд болж чадна- гчийг харуулж байна. Учир нь X -ээр сонгогдсон эле- мент нь тэгтэй тэнцүү бөгөөд эн чацуугаар хувирсан- матрицтай зохистой сонголт нь түүний скаляр үржвэр- оос шийдүүдийн скаляр үржвэрээс бага (дээд зах нь- тэнцүү) байдаг чанартай болохоор бидний олсон зохис- той сонголт, зохистой шийд бас болж чадах ажээ.

15 §. Зохистой шийдийг олох барил

- I. Болдогын нөхцөлийг хүснэгт дүрстэйгээр бичнэ.
- II. Анхны сонголтыг тодорхойлно.
- III. X -ээр сонгогдсон элементүүдийг тэг болгож ху- минаа. Хэрэв энэ үед хүснэгтийн бусад элементүүд ном сөрөг биш байвал, анхны сонголт зохистой байна.
- IV. Хэрэв X -ээр сонгогдсон элементүүдийг тэг бол- гон хувиргасны дараа хүснэгтэнд сөрөг тоо гарсан бидний (туйлын хэмжигдэхүүнээрээ) хамгийн их сөрөг- тийг олно.
- V. Хамгийн их сөрөг элементийг, X -ээр сонгогдсон бидний тэг болж хувирсан элементүүдтэй хамтатган битүү хэлхээ үүсгэж улмаар тэгш хагас хэлхээн дэх- амгийн бага элементтэй тэнцүү x_{ij} -ийг хэлхээн дээ- туур шилжүүлж хоёрдугаар сонголтыг байгуулна.
- VI. Одоо хамгийн их сөрөг элемент маань X -ээр- сонгогдсон элемент болсон болохоор түүнийг тэг бол- гон хувиргах хэрэгтэй. Тэрэхдээ шинэ хувиргалтанд- тохирох X -ээр сонгогдсон бусад элементүүдийг тэг- тэй тэнцүү хэвээр байлгах хэрэгтэй.
- VII. Эдгээр алхмыг, хувирсан хүснэгтийн X -ээр сон- гогдсон бүх элементүүд тэгтэй тэнцүү, харин бусад- элементүүд нь сөрөг биш байх тийм сонголтыг гар- гаж нх хүртэл үргэлжлүүлнэ. Энэхүү сүүдчийн сон- гол нь зохистой шийд болж чадна.

VIII. Ачаа тээвэрлэлтийн зохистой шийдэл тохиромжтой бодож гаргахын тулд өртгийн анхны хүснэгтийн шийд хоёрыг нэгэн хүснэгтэд нэгтгэн бичиж хэрэглэж. Хүснэгтийн нүдэнд байгаа тоонуудын хэрэвэрүүдийн нийлбэр тээвэрлэлтийн өртгийг тодорхойлно.



20 дугаар зураг

Бодлогын зохистой шийдийг олох ажиллагааг дорхой харуулахын тулд түүнийг геометрийн арга дүрсэлн үзүүлэв (20 дугаар зураг).

Хэвтээ тэнхлэг дээр шийдийн дугаарыг босоо, тэдгээрт тэдгээрт харгалзах өртгийн холбогдлыг тус тус тэмдэглэв. Эхлээд анхны шийдээр A_1 цэгийг гаргавна. x -ээр сонгогдсон элементүүдийг тэг болгон виртаж, хэвтээ тэнхлэг дээр A_1 цэг гаргана. Хэрэв энэ цэгт харгалзах хувирсан хүснэгтэнд сөрөг элемент байхгүй байвал A_1 цэгт тохирсон шийд зохистой шийд байна. Хэрэв хүснэгт дурдсан чанарыг агуулдаггүй байвал A_2 цэгийг олж, цааш нь тэнхлэг дээр A_2 цэгийг гарган авч зохистой шийдэд хүрсэн эсэх шалгаж үзнэ. Хэрэв зохистой шийдэд хүрээгүй бол A_3 -ыг олох мэтээр цаашид ажиллана.

Төгсгөлтэй алхмын дараа зохистой шийдэд тохиромжтой шийд хүрэх нь дамжиггүй. Ийм замаар гаргасан өртгийн хугархай шугамыг 20 дугаар зураг дээр дүрсэлн үзүүлэв. Зургаас үзвэл өртгийн хэмжээ анхны шийдэд хорогдсон байна. (Змари ч гэсэн өсөхгүй)

7.5 дугаар хуудсанд тодорхойлсон ачаа тээвэрлэлтийн бодлогоо үргэлжлүүлэн бодъё. Энэ бодлогын анхны сонголтыг 4 дүгээр хүснэгтээр үзүүлэв. x -ээр сонгогдсон элементүүдийг тэг болгож хувиргахын тулд өртгийн матрицийн нэгдүгээр баганын элементүүдээс 4-ийг, хоёрдугаар баганынхнаас 1-ийг тус тус хасъя. Үүний дүнд хоёрдугаар мөр, нэг ба хоёрдугаар баганытай уулзсан уулзвар дээрх x -ээр сонгогдсон элементүүд тэг болж хувирна. Хэрэв гуравдугаар баганын элементүүдээс 6-г хасвал хоёрдугаар мөр гуравдугаар баганын уулзвар дээрх x -ээр сонгогдсон элемент тэг болно. Харин өртгийн матрицийн гуравдугаар мөр, гуравдугаар баганын уулзвар дээрх элемент 1 ба -2 утгатай байна. Өртгийн матрицийн гуравдугаар мөрийн элементүүд дээр 2-ыг нэмж, дөрөвдүгээр баганын элементүүдээс 5-ыг хасвал гуравдугаар мөр, гурав ба дөрөвдүгээр багануудтай огтлолцсон огтлолцол дээрх элементүүд тэг болж хувирна.

a_i	b_j	5	10	20	15
10	1	8	3	5	2
15	2	5	7	10	0
25	3	1	9	4	20
		-4	-1	-6	-5

4 дүгээр хүснэгт

Эцсэд нь нэгдүгээр мөр, дөрөвдүгээр баганын уулзвар дээрх x -ээр сонгогдсон элементийг тэг болгох ажиллагааг үргэлжлүүлнэ. Энэ зорилгоор нэгдүгээр мөрийн элементүүд дээр 3-ыг нэмэх хэрэгтэй. Өртгийн матрицийн анхны эн чиглүүл хувиргалтаар хувиргасны дүнд 4 дүгээр хүснэгт 5 дугаар хүснэгт болж өөрчлөгдөнө. 5 дугаар хүснэгтэд (-1) гэсэн сөрөг элемент байгаа учир анхны сонголт зохистой болох нь эргэлзээтэй. Үүнийг үзэж буй жишээнд ганцхан сөрөг элемент байгаа болохоор тэр нь (гүйлэн хэмжээгээрээ) хамгийн их сөрөг элемент болно.

Энэ сөрөг элементийг x -ээр сонгогдсон элементүүдэд нэгтгэн битүү хэлхээ үүсгэж 6 дугаар хүснэгтэд дүрсэлн үзүүлсэнчлэн хоёрдугаар сонголтыг хийе. Үүний

тулд тэгш хагас хэлхээн дэх хамгийн бага нэгж ачаа сондгой хагас хэлхээ уруу шилжүүлбэ.

— 1 тоо нь х-ээр сонгогдсон тоо болсон учраа түүнийг тэг болгож хувирах хэрэгтэй. Үүний тулд

a_i	b_i	5	10	20	15
10	1	5	2	3	4
15	2	10	20	0	10
25	3	15	10	20	5

5 дугаар хүснэгт

өртгийн матрицт дахин адилтгал хувирахад оруулъя. 6 дугаар хүснэгтийн нэгдүгээр баганын элементүүд дээр 1-ийг нэмбэл х-ээр сонгогдсон бүх элементүү нь тэгтэй тэнцүү, ганц сөрөг элемент байх

7 дугаар хүснэгт үүснэ. Тийнхүү 7 дугаар хүснэгтээр тодорхойлогдох сондгой зохистой сонголт болдоо. Одоо анхны өртгийн матриц, зохистой шийд хоёрыг 8 дугаар хүснэгтэнд нэгтгэе. Энэ төлөвлөгөөнд тохирсон ачаа тээвэрлэлтийн өртөг нь $C = 2 \cdot 10 + 5 \cdot 6 + 10 \cdot 1 + 5 \cdot 3 + 4 \cdot 15 + 1 \cdot 5 = 140$ нэгж байна.

a_i	b_i	5	10	20	15
10	1	5	2	3	4
15	2	10	20	0	10
20	3	15	10	20	5
25	4	20	15	5	10

Энэтөлөвлөгөө ёсоор ачаа тээвэрлэлтийг дараах маягаар зохион байгуулж болно (21 дүгээр зураг).

6 дугаар хүснэгт


Явуулах нэгдүгээр газрын бүх ачааг хүлээн авах төвдүгээр газарт цөмийг шилжүүлж явуулах хоёрд

a_i	b_i	5	10	20	15
10	1	5	2	3	4
15	2	10	20	0	10
25	3	15	10	20	5

7 дугаар хүснэгт.

a_i	b_i	5	10	20	15
10	1	5	2	3	4
15	2	10	20	0	10
25	3	15	10	20	5

8 дугаар хүснэгт



21 дүгээр зураг

нэр газар нь хүлээн авах хоёрдугаар газрын хэрэгцээг 10 нэгж ачаагаар, гуравдугаар газрын хэрэгцээг 5 нэгж ачаагаар явуулах гуравдугаар газар нь хүлээн авах нэгдүгээр газрын хэрэгцээг 5 нэгж ачаагаар, гуравдугаар газар нь тус тус ханганаа. Энэ төлөвлөгөө ёсоор тодорлогдох нь (ийм нөхцөлд тээвэрлэх бусад ямар ч арай төвөгтэй жишээ авч үзье.

Үүнд: Явуулах дөрвөн газраас хүлээн авах зургаан нэгдүгээр газар тус тус зохистой төлөвлөгөөг 9 дүгээр хүснэгтээр тодорхойлогдох нөхцөлд тохируулан зохио. Энэ жишээнд a_i , b_i нь мянган тоннор, C_{ij} нь мянган рублиар илэрхийлэгдэнэ.

a_i	b_i	2	4	5	3	2	6
5	1	2	4	3	1	4	5
7	2	3	3	2	3	1	3
4	3	1	5	2	1	4	5
6	4	2	4	1	3	3	6

9 дүгээр хүснэгт

Анхны
сонголт
 $C_1=75$

5	2	4	5	3	2	6
2	2	0	0	3	4	5
7	3	3	2	3	0	3
4	1	5	2	1	4	0
6	2	4	1	3	3	0
-2	-5	+1	-3	-1	-2	-4

Хүснэгтийн
х-ээр сонгоод-
сон элементийг
тэг доргов

9 д хүснэгт.

Шийдэл ор-
сон элемент-
ийг дээр
дээр нь дөр
дөж нөлөө

2	0	0	0	2	1	-4
2	0	0	0	3	2	0
0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0

5 нэгж
хүснэгтээр
шилжүүлж
дөрөг дүнгээр
дүүрнэ

9 б хүснэгт

9 дүгээр хүснэгтийг дахин бичиж, нүд бүрийн доо
хагаст анхны сонголтын тоонуудыг тавьж зохис-
шийдийг гарган авах бүх ажиглагыг 9 а, б, в, г, д,
хүснэгтүүдээр харуулав.

Өртгийн анхны хүснэгтийг зохистой шийдтэй нэл-
гээ. (10 дугаар хүснэгт)

Ачаа тээвэрлэлтийг хамгийн бага зардалтайга
хэрхэн зохион байгуулбал зохихыг сууцлийн хүснэг-
харуулж байна. Зохистой төлөвлөгөө нь анхны төлө-
лөгөөгөөр төлөвлөсөн 75 мянган рублийг 48 минг
рубль болгон багасгаж 27 мянган рубль хэмнэсэн бай-
на.

Зохистой төлөвлөгөөг харуулсан хүснэгт (5 дүг-
аар хүснэгт) зөвхөн ганц зохистой шийдийг харуула-
аар зогсоогүй, мөн тийм өртөгтэй бүх шийдүүдийг харуу-
аар чадсан сонирхолтой баримтыг зориуд тэмдэглэе.

Үнэхээр ч энэ хүснэгтэнд дүүжилдээгүй тэг эл-
ментүүд байгаа бөгөөд тэднийг * (од)-оор тэмдэглэ-
ийм элемент бүр шийд элементүүдтэй бигүү хэлх-
үүсгэж байна.

Шийдэл дахиадхан элементийг нэгийг зурвал

3-р
сонголт
 $C_2=55$

6	0	4	1	0	0	5
2	0	4	1	0	0	5
2	0	4	1	0	0	5
2	0	4	1	0	0	5
2	0	4	1	0	0	5
2	0	4	1	0	0	5
2	0	4	1	0	0	5

Хэлхээ, зэрэг
нэгжүүлж шил-
жүүлж
дөрөг дүнгээр үндэ-
нэ.

9 в хүснэгт.

1-р хэлхээ

3-р
сонголт
 $C_3=55$

2	0	4	1	0	0	5
2	0	4	1	0	0	5
2	0	4	1	0	0	5
2	0	4	1	0	0	5
2	0	4	1	0	0	5
2	0	4	1	0	0	5
2	0	4	1	0	0	5

1-р хэлхээгээр 2-ыг
дүгээр хэлхээгээр 1-ийг
тус тус шилжүүлж
дөрөг 2-2-1=5 нэг-
жээр хорогдоно.

9 д хүснэгт.

2-р хэлхээ

4-р
сонголт
 $C_4=48$

2	0	4	1	0	0	5
2	0	4	1	0	0	5
2	0	4	1	0	0	5
2	0	4	1	0	0	5
2	0	4	1	0	0	5
2	0	4	1	0	0	5
2	0	4	1	0	0	5

Хэлхээгээр 1-ийг
шилжүүлж
дөрөг 1-1=1
нэгжээр
хорогдоно.

9 г хүснэгт.

5-р
сонголт
 $C_5=48$

1	0	2	0	1	0	0
1	0	2	0	1	0	0
1	0	2	0	1	0	0
1	0	2	0	1	0	0
1	0	2	0	1	0	0
1	0	2	0	1	0	0
1	0	2	0	1	0	0

Зохистой
хийд

9 е хүснэгт.

Зохих дүрмээр нэгэн удаагийн солилт үйлдэж ижил өртөгтэй бусад шийдлүүдийг гарган аэч болон Энэ нь 11 дүгээр хүснэгтээр үзүүлсэн шийдийг э

a_i	2	4	5	3	2	6
5	2	4	3	1	4	5
7	3	3	2	3	1	2
4	1	5	2	1	4	5
2	2	1	1	3	3	1
6	2	4	1	5	3	6

10 дугаар хүснэгт.

хистой шийд болгон авах бололцоог өгч байгаа бөгөөд энэ төлөвлөгөөнд тохирсон тээвэрлэлтийн өртөг багасна.

$$C = 1 \cdot 2 + 4 \cdot 3 + 4 \cdot 1 + 1 \cdot 5 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 5 \cdot 1 + 3 \cdot 5 = 48$$

на. Энэ үед дан тэг элементээс тогтсон битүү хэлбэр бүрийн хувьд анхны хүснэгт дэх түүнд харгалзсан битүү хэлбэрний тэгш ба сондгой хагас хэлбэрээр тодорхойлогдох өртгийн нийлбэр хоорондоо тэнцүү бөгөөд энэ нь $x_i^{m_i}$ -ийг, ерөнхий өртгийг өөрчлөхгүйгээр хэлбэр дээр дээр шилжүүлэх боломж өгнө гэдгийг хялбархан харж болно. Олонх тохиолдолд бүх зохис той шийдийг тодорхойлох явдал шигтэй байдаг. Энэ хүү зохистой олон шийдийн дотроос ачаа тээвэрлэлтийг хамгийн богино хугацаанд гүйцэтгэж чадах төлөвлөгөөг олох дүрмийг цаашид бид үзэх болно.

Эцэст нь хамгийн их сөрөг элемент x -ээр сонгогдсон элементүүдтэй нийлж битүү хэлбэр үүсгэх тухай хэдэн үг өгүүлье. Хэрэв m_i и хоёр цөөхөн байвал бид ний сонирхож буй хэлбэрүүд, дээрх жишээнүүд дээр байсан шиг шууд харагдана. Хэрэв m_i и хоёр ерөнхий дөө их байвал битүү хэлбэр дор дурдсан аргаар ол бол хялбар байдаг. Эхлээд дугуй тэмдэгтэй ганцхан тэг агуулсан бүх багана мөрүүдийг дарна. (Үчир нь хэлбэр үүсгэхийн тулд мөр буюу баганад наад зах нь хоёр тэг байх ёстой). Тэгэхдээ хамгийн их сөрөг

элементийг агуулсан мөр баганыг дарж болохгүй. Ийн үү нэг нэг удаа багана мөрийг дарсны дараа, бас ганцхан дугуй тэмдэгтэй тэг бүхий багана мөрийг дарах жишээтэй цаашид ажиллаж, энэхүү ажиллагааг битүү хэлбэр өөрөө илрэх хүртэл үргэлжлүүлнэ.

1	0	3	2	0	1	1	0	1
4	1	3	4	0	2	0	5	
0	2	1	0	2	1	0		
1	0	1	0	5	2	0	1	

11 дүгээр хүснэгт.

Том хүснэгттэй тодорхой жишээ болох ажил ихий эзлэх учраас битүү хэлбэр хэрхэн гаргаж авахыг харуулсан хялбархан жишээг 12 дугаар хүснэгтээр үзүүлнэ. Эхлээд ганцхан тэг агуулсан 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15 дугаар багануудыг дарж дараа нь ганц, ганц тэг агуулсан 1, 2, 6 дугаар мөрүүдийг дарна. Дараа нь ганц тэгтэй багана буй эсэхийг ажиглавад ганцхан 1 дүгээр багана байна. Үүнийг дарсны дараа мөн тийм мөр байна уу? гэвэл алга байна.


Үүгээр дарах ажиллагаа дуусна. Одоо битүү хэлбэр байгуулахын тулд сөрөг элементээ эхлэн нэг тодорхой чигээр, жишээ нь цагийн үүний хөдлөлийн дагуу, үлдсэн тэг элементүүдийг нийлж тэгш өнцөг үүсгэх хэлбэртэйгээр дас дараалан үндэснэ.

Бид ачаа тээвэрлэлтийн боллогыг зөвхөн өртгийнх нь хувьд болох аргатай танилцахдаа явуулах бүх газрын ачааны тоо хэмжээ, хүлээн авах бүх газрын хэрэгцээг ачааны хэмжээтэй ижил, өөрөөр хэлбэл

$$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^m b_j \text{ байх нөхцөлд танилцсан билээ.}$$

$$\text{Хэрэв } \sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j \text{ байвал } b_{n+1} = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j$$

хүрэлцээтэй хүлээн авах хуурмаг газар байна гэж бодож, энэ газарт хүргэх ачааны өртгийг $C_{n+1} = 0$ гэж үзнэ.



«Стрела» машинаар $m \times n < 500$ эрэмбэтэй матриц бүхий бодлого бодоход 8–10 минут, $m \times n < 1500$ эрэмбэтэй матрицтай бол 25–40 минут, хэдэн мянган тэнцүү эрэмбэ бүхий матрицтай бол 8–10 цаг тус тус шаардлагдана.

92

Жишээ нь дор дурдсан ачаа тэвэрлэлтийн бодлогыг «Стрела» машинаар бодсон юм.

Явуулах есөн газраас хүлээн авах арвандөрвөн тавирт ачаа түгээх шаардлага гарчээ. (15 дугаар хүснэгт) Машинаар бодож олсон анхны сонголтгй 16 дугаар хүснэгт дээр сийрүүлэв.

а/б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
б/а	18	13	21	7	18	12	11	30	15	9	20	8	11	7
33		13				12				8				7
2	18										11			
1	2			2										
4	38		21						5				11	
5	14				5					0	9			
6	23				13					9	1			
7	31				5			18				8		
8	38	18				8	12							
9	1					3								

16 дугаар хүснэгт.

Зохистой шийдэд харгалзах эцсийн сонголтгй 17 дугаар хүснэгтээр харууллаа.

Анхны сонголтгйд тохирсон өртөг $C = 971$, зохистой сонголтгонд тохирсон өртөг $C = 703$ болохыг бодож олоход төвөггүй.

а/б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
б/а	18	13	21	7	18	12	11	30	15	9	20	8	11	7
1	33		13			12			8					7
2	18						11							7
3	2	2												
4	38	11		20					7					
5	14	7		7						6				
6	23									9	14			
7	31		1				30							
8	38	1			18							8	11	
9	1													

17 дугаар хүснэгт.

Энэ бодлогыг машинаар бодоход барагцаалбал нэг минут зарцуулсан.

$m \times n = 30 \times 38$ өртгийн матрицтай ачаа тэвэрлэлтийн өөр нэг бодлогыг бодоход 37 минут зарцуулсан.

IV БҮЛЭГ

АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН БОДЛОГЫГ ЗӨВХӨН ХУГАЦААТАЙ НЬ ХОЛБОЖ БОДОХ

Ачаа тээвэрлэлтийн төлөвлөгөөг зохиоход цаг хугацаа хэмнэх явдлыг юуны түрүүнд чухалчлан үзэж, практик дээр олонтга тохиолддог. Жишээ нь хуучин газарт нь аль болох богино хугацаанд хүргэж, шаардлага бишгүй гардаг билээ. Тариа хураалтыг үеийн чухал нэг ажил нь үр тариаг аль болох хурдан болговсруулах газарт хүргэж өгөх хэрэгтэй байдаг.

Ийм маягийн бодлогууд нь ачаа тээвэрлэлтийн зөрхөн хугацаатай холбогдох бодлогууд мөн бөгөөд ийм бодлогыг бодох нэгэн арга барилтай энэ бүлэг танилцана.

16 §. Асуудлыг тавьж, түүнийг шийдвэрлэх нь

Нэгэн төрлийн ачаа явуулах газрын тоо m , түүнийг хүлээн авах газрын тоо n гэж бодъё. a_1, a_2, \dots, a_m -ээр явуулах нэг, хоёр, ... $i, \dots, b_1, b_2, \dots, b_n$ -ээр хүлээн авах n газар тус бүр хүргэвэл зохих нэгж ачааны тоо хэмжээг тус тус тэмдэглэв.

i, j -ээр явуулах i дугаар газраас хүлээн авах j дугаар газарт ачаа хүргэхэд зарцуулах хугацааг (хоно

буюу цаг) x_{ij} -гээр явуулах i дугаар газраас хүлээн авах j дугаар газарт хүргэхээр төлөвлөсөн нэгж ачааны тоо хэмжээг тус тус тэмдэглэв. Ачаа тээвэрлэлтийн зохистой төлөвлөгөөг, өөрөөр хэлбэл, ачаа тээвэрлэлтийн хугацаа хамгийн бага байж чадах x_{ij} -гийн цөөрөг биш утгуудыг олъё.

Энэ бодлогыг математикийн хэлэн дээр хөрвүүлэн дараах маягаар томъёолж болно.

$$\left. \begin{aligned} \sum_{j=1}^n x_{ij} &= a_i & (i=1, 2, \dots, m), \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} &= b_j & (j=1, 2, \dots, n), \end{aligned} \right\} \quad (27)$$

гэсэн алгебрын шугаман тэгшитгэлийн систем өгөгджээ. Үүнд; a_i, b_j нь

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$$

байх нөхцөлд тохирсон байт. Цаашилбал хугацааны матриц $T = (t_{ij})$ бас өгөгджээ гэж үзье. (27) системийн сөрөг биш $X = (x_{ij})$ шийд бүрд өөрөөр хэлбэл, тээвэрлэлтийн төлөвлөгөөнд, хэрэв $x_{ij} > 0$ байвал $t_{ij} = t_{ji}$, хэрэв $x_{ij} = 0$ байвал $t_{ij}^* = 0$ байх эгзэмнүүд бүхий $T_x = (t_{ij}^*)$ матриц харгалзана.

Энэ бүрийн сөрөг биш X шийдүүдэд харгалзах t_{ij}^* -уудын дотроос хамгийн бага $t_{x \text{ зох}}$ -д тохирох цөөрөг биш хэсэг шийдийг олох зорилго тавь. Энэ бодлогын нөхцөлийг 18 дугаар хүснэгт дүрсгэйтгээр илэрхийлбэл тохиромжтой байдаг.

a_i	b_j	b_j	b_n
a_1	$t_{11} \ x_{11}$	$t_{12} \ x_{12}$	$t_{1n} \ x_{1n}$
a_2	$t_{21} \ x_{21}$	$t_{22} \ x_{22}$	$t_{2n} \ x_{2n}$
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots
a_i	$t_{i1} \ x_{i1}$	$t_{i2} \ x_{i2}$	$t_{in} \ x_{in}$
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots
a_m	$t_{m1} \ x_{m1}$	$t_{m2} \ x_{m2}$	$t_{mn} \ x_{mn}$

18 дугаар хүснэгт

Энэ бодлого ачаа тээвэрлэлтийн зөвхөн өртөгтэй нь холбож бодох бодлогын артаар үл бодогдоно гэж гийт хялбархан үзүүлж болно.

Жишээ нь $C = \sum t_{ij} x_{ij}$ шугаман хэлбэр хамгийн зохистой шийд байж чадах шийд нь хугацааны хувь тодорхойлогдсон бөгөөд 21 дүгээр хүснэгтээр дэлгэсэн жишээний, $C = \sum t_{ij} x_{ij}$ шугаман хэлбэрийн минимумд тохирсон зохистой шийд 20 дугаар хүснэгтээр тодорхойлогдоно. Энэ хүснэгт ёсоор бод дах ачааг зохих газарт нь 6 хоногийн дараа хүргэж ч

$a_i \backslash b_j$	5	10	20	15
10	8	3	5	2
15	4	1	6	7
25	1	9	4	3

19 дүгээр хүснэгт

нөгөө талаас 21 дүгээр хүснэгтээр тодорхойлогдсон төлөвлөгөө ёсоор шугаман хэлбэрийн утга бага зэрэг их байгаа боловч, уул ачааг хэрэгцээт газарт нь дөрвөн хоногийн дотор хүргэж бодох боломжтой байна.

$a_i \backslash b_j$	5	10	20	15
10	8	3	5	2
15	4	1	6	7
25	1	9	4	3

$$C = 2 \cdot 10 + 0.5 + 10 + 3.5 + 4.5 + 1.5 = 74.0$$

$a_i \backslash b_j$	5	10	20	15
10	8	3	5	2
15	4	5	1	6
25	1	9	4	3

$$C = 2 \cdot 10 + 3.5 + 4.20 + 1.10 + 4.5 = 14.5$$

20 дугаар хүснэгт

21 дүгээр хүснэгт

Түрлэн гэмтэх бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд хөсөө тээврийн хурдыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Энэхүү нөхцөлийн хэрэгцээнд зориулсан олон мянган тонн эдлэхүүний яс чанарыг хамгаалж чадсан явдлаар нөхөлдөө Ачаа тээвэрлэлтийн, зөвхөн хугацаатай нь холбох бодлогог шийдэх дор дурдсан аргын баталгаа

II бүлэгт тайлбарласан шугаман программчлалын үрнхий онолоос гарна.

Уул бодлогыг бодох аргыг 22 дугаар хүснэгтээр тодорхойлогдсон бодлогон дээр тайлбарлав. Энэ хүснэгтээс үзвэл явуулах зургаан газарт багтаа 125 нэгж ачааг хүлээн авах 7 газарт явуулах ёстой байна. Хүснэгт дэх тоонууд нь явуулах нэгэн газраас хүлээн авах нэг газарт ачаа хүргэхэд хэрэглэгдэх цагаар илэрхийлэгдсэн хугацаа болов. Жишээлбэл дөрөвдүгээр мөр, дөрөвдүгээр багана хоёрын уулзвар дээр орших 31 гэсэн тоо нь явуулах дөрөвдүгээр газраас хүлээн авах дөрөвдүгээр газарт ачаа хүргэхэд зарцуулах хугацаа 31 цаг байна гэдгийг харуулах ажгуу.

$a_i \backslash b_j$	20	13	11	27	9	5	40
15	12	13	34	18	7	8	23
7	7	18	36	23	40	38	6
45	11	20	30	23	21	21	29
30	27	12	33	20	31	5	35
12	17	17	32	21	22	22	16
16	15	38	24	16	22	23	10

22 дугаар хүснэгт

Хугацааны хувьд зохистой төлөвлөгөө олох зорилго тавь.

22 дугаар хүснэгтийг бага хүснэгт гэж нэрлэж, түүнийг том хүснэгт гэж нэрлэгдэх 23 дугаар хүснэгт болгоё.

Энэ хүснэгтийн эхний мөрөнд x_{ij} хувьсарчийн 11-үс 67 хүртэлх тэмдгүүд, доод мөрөнд нь t_{ij} -гийн i, j дөрвөлжинд хадгалагдах утгуудыг бичжээ. Жишээ нь дээд мөрөн дэх 43 гэсэн хос тоо x_{43} хувьсарчийн байрлалт заах ба энэ хувьсарчийд тохирох t_{43} -ийн утга 39 байна. Ийм учраас 43, 39 хоёр нэгэн багана дээр оршино.

Энэ хүснэгт явуулах газрын тоо буюу өгөгдсөн хүснэгтийн мөрүүдийн тоотой тэнцүү тооны зурвас болон хуваагдсанаас гадна хэвтээ шугамаар бас хоёр хэсэг хуваагдажээ. Тэрэхдээ дээд хэсэгт нь зургаан мөр, доод хэсэгт долоон мөр тус тус орсон байна.

	11	12	13	14	15	16	17	21	22	23	24	25	26	27	31	32	33	34	35	36	37	41	42	43	44	45	46	47	51	52	53	54	55	56	57	61	62	63	64	65	66	67			
= 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	13	34	7	8	29	19	7	18	36	40	38	6	10	11	20	30	21	21	29	31	27	12	39	31	5	36	12	17	17	32	36	22	16	14	15	38	16	33	23	40	28			

23 дугаар хүснэгт

Хүснэгтийн дээд хэсгийн нэгдүгээр мөрийн тооны тушаа нэгдүгээр зурваст долоон хасах тэмдэг, хоёрдугаар мөрийн тооны тушаа хоёрдугаар зурваст мөн долоон хасах тэмдэг тавих жишээтэйгээр бүх зургаан зурваст хасах тэмдэг тавьж. Жишээ нь 30-ын тушааг нийцх хасах тэмдгүүд дөрөвдүгээр зурвасанд бичигдэнэ. Хэрэв анхны хүснэгтийг энэ тэмдэглэлтэй уялдуулан харвал ачаа явуулах дөрөвдүгээр газарт үлдсэн ачааны хэмжээ

$$30 - X_{41} - X_{42} - X_{43} - X_{44} - X_{45} - X_{46} - X_{47}$$

болохыг харуулна.

Үүний нэгэн адил хүснэгтийн доорх хэсэг дэх мөр нэс бүрд орших хасах тэмдгүүд нь хүлээн авах тавиарт дутагдсан ачааны хэмжээг илэрхийлнэ. Жишээлбэл 27-гийн тушаа орших хасах тэмдгүүд нь дөрөвдүгээр баганад харгалзах хүлээн авах газрын дутагдалыг байгаа ачаа.

$$27 - X_{14} - X_{24} - X_{34} - X_{44} - X_{54} - X_{64}$$

тэй тэнцүү болохыг харуулна.

Өөрөөр хэлбэл хүснэгт дэх хасах тэмдгүүдийн нийрлэл нь бололлын нөхцөлийг илэрхийлж байгаа гүйцэтгэлд тохирох ажээ.

III бүлэгт ашигласан аргыг хэрэглэж анхны шийдлийг байгуулъя. Явуулах нэгдүгээр газрын 15 нэгж нийцх хүлээн авах газруудад хамгийн бага хугацааг хэрэглэн түгээж, дараа нь явуулах хоёрдугаар газрын 7 нэгж ачааг хэрэгцээ нь хангагдаагүй байгаа хүлээн авах газруудад хуваарилах жишээтэй цаашид амилдгай. Энэ нь 24 дүгээр хүснэгтээр илэрхийлэгдэх анхны (ерөнхийдөө зохистой биш) шийд юм.

c_i	b_i	20	13	11	37	8	9	3	40
15	12	13	14	7	5	8	29	19	40
7	7	18	36	40	36	6	5	10	
45	11	20	50	21	21	29	31		
30	22	12	39	31	5	7	36	12	23
12	17	17	32	36	22	16	14	12	
16	15	38	16	11	33	23	40	28	5

24 дүгээр хүснэгт

Хялбархан байгуулсан энэ шийд ёсоор ачаа тээврийн хэрэгсэлүүдийг 28 цалийн дотор гүйцэтгэж болох ажлаа хурдан гүйцэтгэж, энэ нь $t_{ij} > 28$ байх нүүдлийг анхаарагдаа авахыг бийж болох боломжийг өгнө. Дурдсан хүснэгтэнд чам хамхүү үүнийг баримтатгасан билээ.

Үүний дүнд нэгдүгээр зурвасын нэг ба аравдугаар мөрөнд

дүрстэй өөрчлөлт гарсан байна.

	11	12	13	14	15	16	17	21	22	23	24	25	26	27	31	32	33	34	35	36	37	41	42	43	44	45	46	47	51	52	53	54	55	56	57	61	62	63	64	65	66	67				
$x_{14}=15$	-	-	/	/	-	/	-			/	/	/	/				/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
$x_{21}=2$			/	/						/	/	/	/				/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
$x_{35}=2$	0	0	/	/	-	0	-	0	/	/	/	/	/				/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
$x_{47}=23$			/	/		/	-			/	/	/	/				/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
$x_{57}=12$			/	/		/				/	/	/	/				/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
$(x_{67})=5$			/	/		/				/	/	/	/				/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
$x_{31}=18$	-		/	/					+	+	+	+		+			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
$x_{32}=13$	-		/	/					-								/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
$x_{63}=11$			/	/						/	/	/	/				/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
$x_{34}=12$	+	+	+		+	+	+			/	/	/	/				/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
$x_{45}=7$			/	/		0		+			+	0		+			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
$x_{26}=5$			/	/						/	/	/	/				/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
$=0$			0			0			0		0		0			0				0			0						0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	12	13	34	②	8	29	19	⑦	18	36	40	38	⑥	10	⑪	20	30	⑩	21	29	31	27	12	39	31	⑤	36	⑫	17	17	32	35	22	16	⑭	15	38	⑬	33	23	40	⑮				

Энэ нь x_{21} хувьсагчийн орших багана дээр байх гэсэн тоо юм. Энэ баганын дагуу орших хоёр хас тэмдгийн харалдаа байх 20,2 хоёрын багтыг нь сонговч 21 дүгээр багана дахь хасах тэмдгүүдийг орхи x_{21} хувьсагчийг 2-ын харалдаа орших тэнцэтгэлийн зүүн талд бичиж, долоодугаар мөрөөс хоёрдугаар мөрийг хасъя. Үүний дүнд хоёрдугаар мөрийн бүх ач түүгэлдэж дууслаа. Энэ ажиллагаат зургаадугаар мөрийн бүх ачаа түүгэлдэж дуусах хүртэл үргэлжлүүлнэ. Энэ бүхний дүнд (24) хүснэгтээр тодорхойлогдох анхны шийд олох ба том хүснэгт маань 25 дугаар хүснэгт болон хувирна.

Хэрэв «+» ба «-» тэмдгийн аль нь ч байхгүй, мөн сүүлийн хүснэгтээс олдож байвал олсон шийд маань үнэн зөв байна. Хэрэв түгээх ажиллагаанд алдаа гаргүй бол, дурдсан мөр зөвхөн тэгээс тогтсон байна. Бидний авсан жишээнд хамгийн сүүлийн мөр мөр юм.

$$\left(\sum_{i=1}^m a_j = \sum_{j=1}^n b_j \right) \text{ нөхцөл ёсоор (27) системийн}$$

тэгшитгэл бусдынхаа мөрдлөг байх ёстой.)

Энэ хүснэгтэд, үндсэн хувьсагчид харгалзах баганаудыг босоогоор $t_{ij} > 28$ -д тохирох баганаудыг шуугаар тус тус зураасласан. Ташуу зураастай баганаудыг цаашид авч үзэхээ больё. Хорин тавдугаар хүснэгт анхныхыг бодвол шийд байгуулах арай буу талтай замыг зааж байна.

Үнэхээр ч бид $t_{ij} = 28$ байх багана дээр орших хувирагч, тухайлбал x_{61} тэгтэй тэнцүү байх тийм шийд олохыг хүссэн билээ. Гэтэл x_{61} -гийн утгыг эсвэл x_{61} , эсвэл x_{65} хувьсагчуудын утгыг багасгах замаар багасгах болохыг энэ хүснэгт үзүүлж байна.

x_{61} хувьсагчид $t_{61} = 15$, x_{65} хувьсагчид $t_{65} = 15$ тус тус харгалзаж байгаа болохоор x_{61} -ийг ихэсгэж x_{61} -г багасгая. 61 дүгээр багана дээрх «-» тэмдг харалдаа зүүн талд нь орших хамгийн бага элемент нь $x_{61} = 5$ байна.

Одоо сүүлийн хүснэгтийг дараах маягаар өөрчилж Ташуу зураастай баганаудын бүрэлдэхүүнээс x_{61} вэл $t_{ij} = 28$ -ыг агуулсан) хувьсагчийг агуулсан баганыг хасаж x_{61} -гийн оронд x_{61} -ийг бичье. Цааш нь дүгээр багана дахь хасах тэмдэг агуулсан мөр

	11	12	14	15	17	21	22	26	27	31	32	34	35	41	42	43	47	51	52	53	56	57	61	65
$x_{16} = 15$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$x_{21} = 2$																								
$x_{21} = 7$																								
$x_{40} = 28$																								
$x_{27} = 12$																								
$x_{61} = 5$																								
$x_{27} = 13$																								
$x_{61} = 11$																								
$x_{16} = 12$																								
$x_{27} = 2$																								
$x_{26} = 5$																								

26 дугаар хүснэгт

x_{61} -д харгалзсан мөрийг хасаж, мөн баганын нэмэх тэмдэгтэй мөрүүд дээр, x_{61} -ийн орших мөрийг нэмбэл 61 дүгээр баганын «-» ба «+» тэмдгүүд арилана.

Үүний дүнд 26 дугаар хүснэгтийг гарган авна. Энэ хүснэгтээс үзвэл ачаа тээвэрлэлтийг үлэмж бага хувираагаар, өөрөөр хэлбэл 28 цагийн дотор биш 21 цагийн дотор гүйцэтгэж болох шийдийг гарган авсан билээ. (Хэрэв x_{61} хувьсагчийг тэгтэй тэнцүүлэх ажиллагааг x_{61} -ийг ихэсгэх замаар биш харин x_{65} -ыг ихэсгэх замаар гүйцэтгэсэн ахул $t_{65} = 23$ -тай тэнцүү хамгийн их хугацаа бүхий шийд гарган авах байсан ба үүний дараа $t_{ij} > 23$ байх бүх баганыг дарж, $t_{ij} = 21$ биш хамгийн их хугацаа бүхий гурав дахь шийдийг олох бас нэг алхам хийх байсныг тэмдэглэе).

Хувиралт нь хоёрдугаар шийдэд хүргэсэн x_{61} , x_{36} , x_{11} , x_{31} , x_{46} , x_{61} хувьсагчдыг дугуйлан тэмдэглэе. Ажлын эдгээр хувьсагч битүү хэлхээ үүсгэх ажээ. (27 дүгээр хүснэгт)

Хэлхээ үүсгэж байгаа хувьсагчдыг агуулсан нүднүүдийг (зайлуулбал зохих) x_{61} хувьсагчийг агуулсан нүднээс эхлэн дутаардлаа. Энэ хэлхээний сондгой дугуйн дугуйн нүднүүдэд заавал х-ээр сонголсон элементүүд орших ба тэгшитгэл нь $t_{ij} \leq t_{зайл}$ элементүүд орших юм байна. Үүнд t_{ij} зайг нь t_{ij} -гийн зайлуулбал зохих утга юм. (Үзэж буй тохиолдолд t_{61} зайг $= 28$) Ийм хэлхээг хөнгөлөгдсөн хэлхээ гэж нэрлэе. Хөнгөлөгдсөн хэлхээг олсны дараа шинэ шийд олохын тулд сонд-

a_i	20	13	11	27	9	5	40
15	12	13	34	7	8	29	19
7	7	19	36	40	35	6	10
15	13	11	41	21	21	29	31
15	13	11	41	21	21	29	31
12	11	17	32	31	5	36	12
15	13	11	41	21	21	29	31
15	13	11	41	21	21	29	31
15	13	11	41	21	21	29	31
15	13	11	41	21	21	29	31

27 дугаар хүснэгт

ГОЙ, хатас хэлхээн дэх нэгж ачаануудын хамгийн б
гьт хэлхээг дээрүүр шилжүүлнэ. Жижиг хүснэгт
дээр байгуулсан энэ байгуулалт хоёрдугаар шийд
өгөх бөгөөд энэ шийд нь том хүснэгтэн дээр ба
руулсан хоёрдугаар шийдтэй давхцана. $t_{ij} > 21$ ба
багацуудыг (нүднүүдийг) цаашид авч үзэхээ боли
үний дүнд 28 дугаар бага хүснэгт, 26 дугаар
хүснэгтийг тус тус гарган авна. (41, 55, 65 дугаар
гануудыг дарсанд тооцож) ачаа тээвэрлэлтийг 21
гаас бага хугацаанд гүйцэтгэж чадах улам илүү
хистой шийд олдох уу? гэдэг асуулт аяндаа гарч
Энэ асуултанд хариулахын тулд 26 дугаар хүсн
тийг авч үзье. t_{ij} -гийн орших мөрнөөс түүний хэ
гийн их утга 21-ыг хайж олбё. Энэхүү $t_{31} = 21$ ут
хэ хувьсагч харгалзах ба хэ орших мөрөнд зөх
«+» тэмдгүүд байна. Энэ мөрөнд «-» тэмдэг байх
байгаа явдал хэ хувьсагчийг бусад аль ч хувьс
чийнх нь утгаар багасгаж болохгүйг гэрчилж бай
хэ-ийг гаргах, иймд $t_{31} = 21$ -ээс чөлөөлөгдөх я
ч боломж эгэ үед алга. Тийнхүү сүүлчийн шийд
хугацааны хувьд зохистой шийд ажээ. Энэ шийд ёсо
ааа тээвэрлэлтэд 21 цаг шаардлага ба 28 дуга
жижиг хүснэгтэнд хөнгөрсөн хэлхээ байгуулах
ломжгүй.

Ачаа тээвэрлэлтийн зөвхөн хугацааны хувьд
догдох боллогыг тайлбарлах зорилгоор том жиж
хоёр хүснэгт ашигласан билээ.

Ийм боллогыг биечлэн болоход жижиг буюу т
ганцхан хүснэгт ашиглаж болох ба гагцхүү дото
тоонуудыг харандаагаар бичих хэрэгтэй. Ийнхүү

шийдээс нөгөө шийдэд шилжих ажлыг ганцхан хүс
нэгтэн дээр багдуур харандаа хоёрын тусламжтай
гүйцэтгэж болох ажээ.

a_i	20	13	11	27	9	5	40
15	12	13	34	7	8	29	19
7	7	19	36	40	38	6	10
45	11	20	30	21	27	29	31
30	27	12	39	31	5	36	12
12	17	17	32	36	22	16	14
16	15	38	16	33	23	40	28

$C=1776$ К

28 дугаар хүснэгт

Ачаа тээвэрлэлтийн хугацааны хувьд бологдох бод
логын бодох зохистой шийдийг жижиг хүснэгт ашиг
лан олох дүрмийг дараах маягаар томъёолж болно.

1. Бодлогын нөхцөлийг жижиг хүснэгтэнд бичнэ.
2. Анхны шийдийг олно. (Жинхэнэ нь дээр дурьдсан
нргаар)

3. Энэ шийдэд тохирсон t_{ij}^{max} -ыг олно.

4. $t_{ij} > t_{ij}^{max}$ байх бүх нүднүүдийг дарна.

5. t_{ij}^{max} элемент бусад элементүүдтэй хөнгөрсөн
хэлхээ үүсгэж буй эсэхийг шинжилнэ.

6. Хэрэв t_{ij}^{max} элементэд тохирох нүдийг бүрэн сул
лиж болох боломжгүй бол (өөрөөр хэлбэл харгалзах
 t_{ij} -ийг тэг болгож хувиргах) t_{ij}^{max} -тай шийд нь зохис
той шийд байна.

7. t_{ij}^{max} -тай нүдийг бүрэн сулласны дараа шинээр
нэртэн авах шийдэд тохирох t_{ij}^{max} -ыг олно.

Ийнхүү бид зохистой шийд олох анхны алхмыг
хийлээ. Хэрэв үүний дүнд зохистой шийд гарч ирэхгүй
бол дурдсан дүрмийн 4 дүгээр зүйлийг ашиглаж хоёр
дугаар алхамд шилжин орно.

Зохистой шийд гаргаж авахын тулд төгсгөлтэй тоо-
ны алхам хийнэ.

Энэхүү дүрмийг ашиглахад тохислох гол бэрхшээл нь хөнгөрсөн хэлхээ гаргаж авахад оршино. Гэвч ашиглах аргаар нь дээр бид тодорхой танилцсан тоо хүснэгтийг ашиглавал онц бэрхшээлгүйгээр зохистой шийдийг гарган авах боломжтой.

Энэ бодлогыг бодох өөр арга сэлтүүдийг дурдлаа болох юм.

m , n хоёр цөөхөн байх үед ийм бодлогуудыг гаргаар бодож болох ба m , n хоёр олон байхад тооцоо бодох электрон машин хэрэглэхээс өөр зам байдалгүй. Ачаа тээвэрлэлтийн зөвхөн хугацааны хувьд бодлогыг бодлогыг машинаар бодоход зарцуулах хугацаа, өртгийн хувьд бодох бодлогынхтой бараг адилхан байна.

17 §. Ачаа тээвэрлэлтийн бодлогын өртөг ба цаг хугацааг зэрэг оролцуулан бодох

Практик үйл ажиллагаан дээр өртгийн ба цаг хугацааны хувьд зохистой төлөвлөгөөнуудийн дундаа төлөвлөгөөг хэрэгжүүлбэл зохимжтой байх тал бий. Асуудлыг хялбарчлахын тулд өртөг нь хугацаанд пропорциональ, өөрөөр хэлбэл $c_{ij} = Kt_{ij}$ гэж үзье.

Бидний дээр авч үзсэн жишээний өртгийн хувиар дахь зохистой шийд нь 29 дүгээр хүснэгтээр тодорхойлогдох ба 28 цагийн дотор $C = K(7 \cdot 15 + 6 \cdot 5)$

$a_i \backslash b_j$	9	20	13	11	27	9	5	40
15	12	15	34	7	15	8	29	19
7	1	18	36	40	38	6	5	10
4.5	11	20	30	21	12	21	29	31
30	27	12	39	31	5	36	12	27
12	17	17	34	36	22	16	14	12
16	15	36	16	33	23	40	28	5

$C = 1668 K$

29 дүгээр хүснэгт

$+ 10 \cdot 2 + 11 \cdot 20 + 20 \cdot 13 + 21 \cdot 12 + 5 \cdot 9 + 12 \cdot 21 + 14 \cdot 12$
 $+ 16 \cdot 11 + 28 \cdot 5 = K 1668$ нэгж өртөгтэйгээр уул авч тээвэрлэлт гүйцэтгэгдэнэ.

Хугацааны хувьд зохистой шийдэд харгалзах өртөг нь (28 дугаар хүснэгт) $C = K(7 \cdot 15 + 7 \cdot 2 + 6 \cdot 5 + 11 \cdot 13 + 20 \cdot 13 + 21 \cdot 12 + 21 \cdot 7 + 5 \cdot 2 + 12 \cdot 28 + 14 \cdot 12 + 15 \cdot 5 + 16 \cdot 11) = 1716 K$ байна.

$a_i \backslash b_j$	9	20	13	11	27	9	5	40
15	12	15	34	7	15	8	29	19
7	1	18	36	40	38	6	5	10
4.5	11	20	30	21	12	21	29	31
30	27	12	39	31	5	36	12	27
12	17	17	34	36	22	16	14	12
16	15	36	16	33	23	40	28	5

30 дугаар хүснэгт

1716 K — 1668 K = 48 K өртөг илүү зарцуулж, өртгийн олсон зохистой шийдээр тодорхойлогдох хугацаанаас 7 цагийн өмнө уул тээвэрлэлтийг гүйцэтгэж болох нь харгдаж байна.

Энэ жишээнээс үзвэл ялигүй нэмэгдэл зардал гаргах замаар ачаа тээвэрлэлтийг үлэмж богино хугацааны дотор гүйцэтгэж хугацаа хожих болох ажээ.

$a_i \backslash b_j$	9	20	13	11	27	9	5	40
15	12	15	34	7	15	8	29	19
7	1	18	36	40	38	6	5	10
4.5	11	20	30	21	12	21	29	31
30	27	12	39	31	5	36	12	27
12	17	17	34	36	22	16	14	12
16	15	36	16	33	23	40	28	5

31 дүгээр хүснэгт

Хэрэв ачаа тээвэрлэлтийг гүйцэтгэх тодорхой хугацаа заагдсан байвал дурдсан аргыг ашиглаж, энэ хугацаанд амжих бөгөөд өртгийн хувьд зохистой тө-

лөвлөгөөт олж болно. Ер нь хугацааг чухалчлан үзвэр хугацааны хувьд зохистой шийдийг олох ба хэрэг t_{ij} -той шийд өртгийн хувьд хамгийн сайн нь биш байвал шугаман хэлбэрийн минимумыг олох арга бари-
лыг ашиглаж, хугацааны хувьд зохистой (t_{ij} хугацаанд гүйцэтгэгдэх) шийдүүдийн дотроос өртгийн хувьд зохистой нь шилэн авч болно. Жишээлбэл бид ний танил нэгэн жишээний хугацааных нь хувьд бодогдсон (30 дугаар хүснэгтээр үзүүлсэн) зохистой шийд нь өртгийн хувьд зохистой шийд болж чадахгүй. Одоо х-ээр сонгогдсон элементүүдийг нь тэг болгож хуви-
гатай. (х-ээр сонгогдсон элементүүдийг тэг болгож ху-
виргах үед дарагдсан нүднүүд дэх элементүүдийг үр-
анхаарна) (31 дүгээр хүснэгт)

$a_i \backslash b_j$	20	13	11	27	9	5	40
15	15	7		① 15	1		5
7	14	16				① 5	2
45	① 15	① 13		① 12	① 5		
30		8			4		26
12	20	11			6	① 12	
16	① 5		① 11				

$$C = 1688H$$

32 дугаар хүснэгт.

Үүний дунд (—14) элементийг агуулсан хүснэгт гар-
ган авлаа. 31 дүгээр хүснэгтийг дахин хувиргаж 32
дугаар хүснэгтийг гарган авна. Энэ хүснэгтэнд х-ээр
сонгогдсон элементүүд тэгтэй тэнцүү, бусад нь сөрөг
биш байна. Ийм учраас энэ шийд нь өртгийн хувьд
зохистой шийд ажээ. Энэ төлөвлөгөө нь 21 цагийн до-
тор $C = 1688K$ өртөгтэйгээр биелэгдэх бөгөөд 1716 кг
бодвол нилээд бага өртөгтэй юм.

Сүүлийн жилүүдэд эдийн засаг, техник, цэргийн
үйл ажлад логика зэрэгт шугаман программчлалын арга
улам өргөн дэлгэр хэрэглэгдэх болж байна. Шугаман
программчлалын арга ба онол тасралтгүй хөгжиж шугаман
на шинэ бодлого бодож чадах болж байна. Ялангуяа
тооцон бодох техникийн эрчимтэй хөгжил шугаман

программчлалын ямар ч бодлогыг бодох боломжтой
болгодоо.

Шугаман программчлалын аргын цаашдын хөгжил,
түүнийг ардын аж ахуйн зорилгод ашиглах явдал ма-
най орны үйлдвэрлэлийг зохион байгуулах, төлөвлөх
ажилд асар их тус нэмэр үзүүлэх нь дамжиггүй.

ХОЛБОГДОХ НОМЫН ЖАЛГААЛТ

1. Л. В. Канторович, Математические методы организации и планирования производства, изд. МГУ, 1939.
2. Л. В. Канторович и М. К. Гаврун, Математические методы планирования грузопотоков, сб. АН СССР «Проблемы повышения эффективности работы транспорта», 1953.
3. В. М. Каган и Т. М. Тер-Микаэлян, Решение инженерных задач на автоматических цифровых вычислительных машинах, Госэнергоиздат, 1958.
4. А. И. Китов, Электронные цифровые машины, изд. «Советский радио» 1956.
5. А. Г. Куроп, Курс высшей алгебры, физматгиз, 1959.
6. Л. А. Люстерник, Выпуклые фигуры и многогранники, Гос-техиздат, 1956.
7. С. И. Черников, Линейные неравенства, УМН, т. 8, вып. 2 1953.
8. Н. В. Черникова, Наименьшие и наибольшие значения линейной формы на многограннике, УМН, т. 12, вып. 2 (1957).
9. A. Charnes, W. W. Cooper and A. Henderson, An Introduction to linear Programming, John Wiley, New York, 1953.
10. C. W. Churchman, R. L. Ackoff, C. L. Arnoff, Introduction in Operations Research, London—New York, 1955.
11. D. Chandler, Linear Programming and Computers, New York, 1955.
12. A. Glaisel, Algorithm for Solution of Transportation Problem, 1955.
13. S. Vaida, The Theory of Games and Linear Programming, London—New York, 1956.